

· 肝纤维化及肝硬化 ·

DOI: 10.12449/JCH260817

肝硬化食管胃静脉曲张内镜下治疗后再出血的危险因素分析及列线图模型构建

邵慧娟¹, 韩世妮², 张爱萍¹, 张玉玲¹, 李 挺¹, 韩 亚³, 张久聪⁴, 窦文杉¹, 王秀霞¹, 杜宏伟¹

1 兰州市第二人民医院消化内科, 兰州 730000

2 兰州市第二人民医院中医日间病房, 兰州 730000

3 兰州市第二人民医院病理科, 兰州 730000

4 中国人民解放军联勤保障部队第九四〇医院消化内科, 兰州 730050

通信作者: 杜宏伟, dhwdyx@163.com (ORCID: 0000-0001-7032-6792)

摘要: **目的** 分析肝硬化食管胃静脉曲张内镜治疗后再出血的危险因素并构建临床预测模型,为早期预测再出血、降低再出血发生率及改善患者临床转归提供参考。**方法** 回顾性分析2021年1月1日—2025年5月31日在兰州市第二人民医院消化内科经内镜首次治疗的194例肝硬化食管胃静脉曲张破裂出血患者的临床资料,按照患者经内镜治疗后1年内是否发生消化道再出血分为再出血组和未出血组。计量资料两组间比较采用成组 t 检验或Mann-Whitney U 检验。计数资料两组间比较采用 χ^2 检验或Fisher确切概率法。将入选患者按照7:3比例随机分为训练集和验证集。在训练集中,通过Lasso回归分析筛选最优预测变量,然后将可能影响预后的因素纳入单因素和多因素Logistic回归分析,筛选肝硬化食管胃静脉曲张再出血的独立预测因素,并以筛选出的变量构建列线图模型。在训练集与验证集中,通过受试者操作特征曲线(ROC曲线)和校准曲线评估列线图模型的分辨力及校准度,决策曲线分析(DCA)和临床影响曲线(CIC)用以评估模型的临床实用性。**结果** 194例肝硬化食管胃静脉曲张患者经内镜治疗后1年内,发生再出血者116例(59.79%),其中训练集和验证集再出血患者分别为76例和40例。在训练集中,经Lasso回归分析、单因素和多因素Logistic回归分析后,筛选出4个与肝硬化食管胃静脉曲张再出血相关的独立预测因子,分别为肝硬化病因[比值比(OR)=3.540,95%置信区间(95% CI):1.520~7.150, $P<0.001$]、蔡尔德-皮尤分级(OR =3.560,95% CI :1.380~9.500, $P=0.019$)、食管胃静脉曲张程度(OR =8.190,95% CI :3.568~17.850, $P=0.026$)和门静脉主干直径(OR =2.954,95% CI :1.349~15.030, $P=0.044$)。以上述独立预测因子构建列线图模型,ROC曲线分析显示,该列线图模型在训练集和验证集的曲线下面积分别为0.845(95% CI :0.778~0.912)和0.801(95% CI :0.798~0.868);训练集和验证集的一致性指数分别为0.832和0.820,提示区分度较好。Hosmer-Lemeshow检验结果显示 P 值分别为0.320和0.550,校准曲线显示,列线图模型预测概率与实际概率具有良好一致性,说明校准度较好;DCA和CIC分析结果表明,该模型具有良好的临床效用。**结论** 基于肝硬化病因、蔡尔德-皮尤分级、食管胃静脉曲张程度和门静脉主干直径构建的列线图模型对肝硬化食管胃静脉曲张再出血风险预测具有一定的临床价值。

关键词: 肝硬化;食管和胃静脉曲张;内窥镜检查;出血;危险因素;列线图**基金项目:** 甘肃省卫生健康行业科研项目(GSWSKY2023-34);兰州市青年科技人才创新项目(2024-QN-39)

Risk factors for rebleeding after endoscopic therapy for esophageal and gastric varices in liver cirrhosis patients and construction of a nomogram model

Shao Huijuan¹, Han Shini², Zhang Aiping¹, Zhang Yuling¹, Li Ting¹, Han Ya³, Zhang Jiucong⁴, Dou Wenshan¹, Wang Xiuxia¹, Du Hongwei¹

1. Department of Gastroenterology, The Second People's Hospital of Lanzhou, Lanzhou 730000, China; 2. Day Ward, Department of Traditional Chinese Medicine, The Second People's Hospital of Lanzhou, Lanzhou 730000, China; 3. Department of Pathology, The Second People's Hospital of Lanzhou, Lanzhou 730000, China; 4. Department of Gastroenterology, The 940th Hospital of Joint

Logistics Support Force of PLA, Lanzhou 730050, China

Corresponding author: Du Hongwei, dhwdyx@163.com (ORCID: 0000-0001-7032-6792)

Abstract: Objective To investigate the risk factors for rebleeding after endoscopic therapy for esophageal and gastric varices in liver cirrhosis patients, to construct a clinical predictive model, and to provide a reference for predicting rebleeding in the early stage, reducing the incidence rate of rebleeding, and improving the clinical outcome of patients. **Methods** A retrospective analysis was performed for the clinical data of 194 liver cirrhosis patients with gastroesophageal variceal bleeding who received initial endoscopic therapy at Department of Gastroenterology, The Second People's Hospital of Lanzhou, from January 1, 2021 to May 31, 2025. According to whether rebleeding occurred within 1 year after endoscopic therapy, the patients were divided into rebleeding group and non-rebleeding group. The independent-samples *t* test or the Mann-Whitney *U* test was used for comparison of continuous data between two groups, and the chi-square test or the Fisher's exact test was used for comparison of categorical data between two groups. The patients enrolled were randomly divided into a training set and a validation set at a ratio of 7:3. In the training set, the Lasso regression analysis was used to obtain optimal predictive variables, and the factors that might affect prognosis were included in the univariate and multivariate Logistic regression analyses to identify independent predictive factors for rebleeding after endoscopic therapy for esophageal and gastric varices in liver cirrhosis patients, which were used to construct a nomogram model. In both the training set and the validation set, the receiver operating characteristic (ROC) curve and the calibration curve were used to assess the discriminatory ability and calibration of the model, and decision curve analysis and the clinical impact curve were used to assess the clinical practicability of the model. **Results** Among the 194 liver cirrhosis patients with esophageal and gastric varices, 116 (59.79%) experienced rebleeding within 1 year after endoscopic therapy, with 76 patients in the training set and 40 patients in the validation set. In the training set, the Lasso regression analysis and the univariate and multivariate Logistic regression analyses showed that etiology of liver cirrhosis (odds ratio [OR]=3.540, 95% confidence interval [CI]: 1.520—7.150, $P<0.001$), Child-Pugh class (OR=3.560, 95%CI: 1.380—9.500, $P=0.019$), severity of esophageal and gastric varices (OR=8.190, 95%CI: 3.568—17.850, $P=0.026$), and main portal vein diameter (OR=2.954, 95%CI: 1.349—15.030, $P=0.044$) were independent predictive factors for rebleeding of esophageal and gastric varices in liver cirrhosis patients. A nomogram model was constructed based on the above independent predictive factors. The ROC curve analysis showed that this model had an area under the ROC curve of 0.845 (95%CI: 0.778—0.912) in the training set and 0.801 (95%CI: 0.798—0.868) in the validation set. The model had an index of concordance of 0.832 in the training set and 0.820 in the validation set, suggesting that the model had a good discriminatory ability. The Hosmer-Lemeshow test showed *P* values of 0.320 and 0.550 in the training set and validation set, respectively, the calibration curve indicated that the predicted probabilities of the nomogram model were in good concordance with the actual observed probabilities, suggesting that the model had good calibration. The decision curve analysis and the clinical impact curve showed that the model had good clinical utility. **Conclusion** The nomogram model based on etiology of liver cirrhosis, Child-Pugh class, severity of esophageal and gastric varices, and main portal vein diameter has a certain clinical value in predicting the risk of rebleeding from esophageal and gastric varices in liver cirrhosis.

Key words: Liver Cirrhosis; Esophageal and Gastric Varices; Endoscopy; Hemorrhage; Risk Factors; Nomograms

Research funding: Gansu Provincial Health and Wellness Industry Scientific Research Project (GSWSKY2023-34); Lanzhou Youth Science and Technology Talent Innovation Project (2024-QN-39)

食管胃静脉曲张破裂出血(esophagogastric variceal bleeding, EVB)起病急骤,属于肝硬化最为常见的并发症之一,再出血是EVB治疗后患者可能发生的严重临床不良事件。在未接受二级预防的患者中,再出血的发生率可高达60%,并伴有更高的死亡风险^[1-2]。内镜检查是目前评估出血风险及诊断食管胃静脉曲张最准确的方法。尽管内镜下曲张静脉套扎术(endoscopic variceal ligation, EVL)与内镜下硬化剂注射治疗(endoscopic injection sclerotherapy, EIS)已作为指南推

荐的标准治疗方法用于防治再出血^[3],但文献报道经内镜治疗后患者的再出血发生率仍接近41.30%^[4],相关病死率高达25%^[5]。不同患者的再出血风险存在差异,因此,有必要根据患者的预期风险制定个性化的治疗和随访。

本研究旨在构建基于患者临床特征和常用血清学指标的列线图模型,以预测肝硬化食管胃静脉曲张再出血的风险。通过早期识别再出血的高风险患者,为干预及指导临床决策提供依据。

1 资料与方法

1.1 研究对象 选取2021年1月1日—2025年5月31日于兰州市第二人民医院消化内科诊断为肝硬化EVB的患者。收集患者的人口统计学资料、临床数据和实验室检查结果。纳入标准:(1)年龄18~75周岁;(2)各种病因所致肝硬化;(3)经内镜明确诊断为EVB,并于兰州市第二人民医院首次接受内镜下治疗,随访时间为1年;(4)病史相关资料完整;(5)签署知情同意书。排除标准:(1)胃癌、胃溃疡、十二指肠溃疡、肝癌、胆囊癌、胆管癌、胰腺癌、药物等非食管胃静脉曲张破裂因素导致的消化道出血;(2)肝性脑病、昏迷状态等无法接受或配合内镜治疗者;(3)合并其他脏器的恶性肿瘤;(4)合并心、肺、肾等重要脏器严重疾病者;(5)妊娠或哺乳期妇女;(6)行外科手术止血治疗;(7)行门体分流术、断流术治疗,如经颈静脉肝内门体分流术;(8)随访过程中失访者。

1.2 肝硬化EVB内镜下操作规范及流程 EVL:适用于LDRf分型D1.0~D2.0食管静脉曲张和胃食管静脉曲张1型EVB患者。EIS:不适合EVL的食管静脉曲张者,可采用EIS,与EVL控制出血效果相似,采用曲张静脉内注射为主;每次注射1~4点;初次注射每点约10 mL,总量一般不超过40 mL/次,根据静脉曲张的严重程度,减少或增加剂量。胃镜下组织黏合剂注射:适合孤立性胃静脉曲张和胃食管静脉曲张2型出血^[6]。内镜下治疗由2名统一培训的高年资内镜医师完成。

1.3 结局定义 主要临床结局定义为首次出血后12个月内再出血事件。再出血定义:出血控制后再次发生有临床意义的活动性出血事件,如呕血、黑便或便血;收缩压降低>20 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa)或心率增加>20次/min;在未输血的情况下,血红蛋白下降>30 g/L^[7]。

1.4 资料收集 患者的基线数据以回顾性方式收集,由2名研究调查员收集所有患者的人口统计学变量、临床数据及实验室检查结果,不一致的数据均经再次核查予以确认。所有患者首次经内镜治疗后,通过电话、门诊或住院方式进行随访,研究终点为发生食管胃静脉曲张导致的消化道再出血、随访满1年或研究终止。根据内镜治疗后1年内是否发生消化道再出血,将患者分为未出血组与出血组。

变量选取:(1)人口统计学变量,包括年龄、性别、体重指数、吸烟史、饮酒史、肝硬化病因、既往史(高血压、糖尿病)、是否伴有肝性脑病、是否伴有腹水、是否伴有

门静脉高压性胃病、是否伴有门静脉血栓;红色征;食管胃静脉曲张程度。(2)实验室检查,包括白细胞、中性粒细胞、淋巴细胞、单核细胞、红细胞、血红蛋白、血小板、总胆红素、胆碱酯酶、天冬氨酸氨基转移酶、丙氨酸氨基转移酶、天冬氨酸氨基转移酶/丙氨酸氨基转移酶比值、碱性磷酸酶、 γ -谷氨酰转氨酶、血清总胆固醇、甘油三酯、白蛋白、球蛋白、前白蛋白、肌酐、尿酸、凝血酶原时间、国际标准化比值、凝血酶原活动度、活化部分凝血活酶时间、凝血酶时间、D-二聚体、纤维蛋白原、血氨、门静脉主干内径等。

1.5 统计学方法 应用R 4.3.1软件进行统计学分析。正态分布的计量资料以 $\bar{x} \pm s$ 表示,两组间比较采用成组 t 检验;非正态分布的计量资料以 $M(P_{25} \sim P_{75})$ 表示,两组间比较采用Mann-Whitney U 检验。计数资料两组间比较采用 χ^2 检验或Fisher确切概率法。将入选患者按7:3比例随机分为训练集和验证集。在训练集中,通过Lasso回归分析筛选最优预测变量,然后将可能影响预后的因素纳入单因素和多因素Logistic回归分析,筛选肝硬化食管胃静脉曲张再出血的独立预测因素,并以筛选出的变量构建列线图模型。在训练集与验证集中,通过受试者操作特征曲线(receiver operator characteristic curve, ROC曲线)和校准曲线评估列线图模型的区分度及校准度,决策曲线分析(decision curve analysis, DCA)和临床影响曲线(clinical impact curve, CIC)用以评估模型临床实用性。 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 基线临床资料 共纳入194例患者,其中训练集136例,验证集58例。训练集中76例(55.88%)患者内镜治疗后1年内发生消化道再出血,验证集中40例(68.97%)患者发生再出血。训练集与验证集患者临床资料比较,除性别、电解质紊乱(P 值均<0.05)外,一般资料、基础疾病及实验室指标比较差异均无统计学意义(P 值均>0.05)(表1)。再出血与未出血患者的临床资料比较详见表2。

2.2 预测模型的构建 在训练集中,通过Lasso回归分析筛选出11个相关变量(图1、2),在此基础上采用单因素和多因素Logistic回归分析,结果显示,蔡尔德-皮尤分级(Child-Pugh分级)、肝硬化病因、食管胃静脉曲张程度和门静脉主干直径是肝硬化食管胃静脉曲张再出血的独立危险因素(P 值均<0.05)(表3)。以上述独立危险因素构建肝硬化食管胃静脉曲张再出血的预测模型,并将模型可视化列为列线图(图3)。

表1 训练集与验证集临床资料比较
Table 1 Clinical data between the training set and internal validation set

指标	训练集(<i>n</i> =136)	验证集(<i>n</i> =58)	统计值	<i>P</i> 值
年龄(岁)	55.51 ± 11.21	52.86 ± 12.22	<i>t</i> = -1.468	0.144
性别[例(%)]			χ^2 = 7.563	0.006
女	69(50.74)	17(29.31)		
男	67(49.26)	41(70.69)		
体重指数(kg/m ²)	22.48 ± 3.48	22.33 ± 4.28	<i>t</i> = -0.262	0.794
家族史[例(%)]			χ^2 = 0.087	0.768
无	115(84.56)	50(86.21)		
有	21(15.44)	8(13.79)		
吸烟史[例(%)]			χ^2 = 0.035	0.853
无	84(61.76)	35(60.34)		
有	52(38.24)	23(39.66)		
饮酒史[例(%)]			χ^2 = 0.003	0.956
无	92(67.65)	39(67.24)		
有	44(32.35)	19(32.76)		
肝硬化病因[例(%)]			χ^2 = 0.779	0.677
乙型肝炎	92(67.65)	41(70.69)		
自身免疫性	26(19.12)	11(18.97)		
酒精性	18(13.24)	6(10.34)		
门静脉高压治疗史[例(%)]			χ^2 = 0.077	0.781
无	33(24.26)	13(22.41)		
有	103(75.74)	45(77.59)		
高血压[例(%)]			χ^2 = 0.016	0.899
无	102(75.00)	44(75.86)		
有	34(25.00)	14(24.14)		
糖尿病[例(%)]			χ^2 = 0.265	0.607
无	129(94.85)	56(96.55)		
有	7(5.15)	2(3.45)		
Child-Pugh 分级[例(%)]			χ^2 = 0.231	0.631
A 级	111(81.62)	49(84.48)		
B 级	25(18.38)	9(15.52)		
肝性脑病[例(%)]			χ^2 = 0.233	0.630
无	129(94.85)	54(93.10)		
有	7(5.15)	4(6.90)		
腹水[例(%)]			χ^2 = 1.413	0.235
无	52(38.24)	17(29.31)		
有	84(61.76)	41(70.69)		
门静脉高压性胃病[例(%)]			χ^2 = 3.600	0.058
无	52(38.24)	14(24.14)		
有	84(61.76)	44(75.86)		
门静脉血栓[例(%)]			χ^2 = 0.392	0.531
无	113(83.09)	46(79.31)		
有	23(16.91)	12(20.69)		
腹膜炎[例(%)]			χ^2 = 0.230	0.631
无	131(96.32)	55(94.83)		
有	5(3.68)	3(5.17)		

表 1(续)

Table 1 (continued)

指标	训练集(<i>n</i> =136)	验证集(<i>n</i> =58)	统计值	<i>P</i> 值
电解质紊乱[例(%)]			$\chi^2=8.822$	0.003
无	42(30.88)	31(53.45)		
有	94(69.12)	27(46.55)		
门静脉主干直径(mm)	16.23±4.24	16.05±4.78	<i>t</i> =-0.259	0.796
脾静脉直径(mm)	11.13±3.01	10.86±2.27	<i>t</i> =-0.631	0.541
门静脉血流速度(cm/s)	11.71±2.75	10.95±2.25	<i>t</i> =-1.870	0.063
食管胃静脉曲张程度[例(%)]			$\chi^2=0.492$	0.782
轻度	81(59.56)	33(56.90)		
中度	43(31.62)	21(36.21)		
重度	12(8.82)	4(6.90)		
红色征[例(%)]			$\chi^2=1.135$	0.287
无	28(20.59)	16(27.59)		
有	108(79.41)	42(72.41)		
组织胶用量(mL)	1.00(0.50~1.50)	1.00(0.50~2.00)	<i>Z</i> =-1.390	0.164
治疗方式[例(%)]			$\chi^2=0.672$	0.412
EIS	53(38.97)	19(32.76)		
EIS+EVL	83(61.03)	39(67.24)		
白细胞($\times 10^9/L$)	3.00(2.47~4.78)	3.45(2.43~5.02)	<i>Z</i> =-0.503	0.615
中性粒细胞($\times 10^9/L$)	2.05(1.43~3.90)	2.10(1.52~3.17)	<i>Z</i> =-0.560	0.575
中性粒细胞百分比(%)	0.69±0.12	0.67±0.10	<i>t</i> =-0.889	0.375
淋巴细胞($\times 10^9/L$)	0.70(0.41~0.90)	0.70(0.50~1.00)	<i>Z</i> =-0.708	0.479
单核细胞($\times 10^9/L$)	0.26(0.17~0.38)	0.29(0.17~0.44)	<i>Z</i> =-1.196	0.232
红细胞($\times 10^{12}/L$)	3.60±0.88	3.62±1.04	<i>t</i> =0.182	0.856
血小板($\times 10^{12}/L$)	57.00(42.25~91.00)	56.50(43.00~81.25)	<i>Z</i> =-0.359	0.720
血红蛋白(g/L)	97.57±28.64	99.79±34.08	<i>t</i> =0.468	0.640
总胆红素($\mu\text{mol/L}$)	27.90(20.43~41.53)	31.55(20.80~47.25)	<i>Z</i> =-0.553	0.580
胆碱酯酶(U/L)	4 074.50(2 974.00~4 577.00)	3 897.50(3 016.25~4 879.50)	<i>Z</i> =-0.370	0.711
AST(U/L)	31.00(22.00~43.00)	32.00(23.00~48.25)	<i>Z</i> =-0.953	0.341
ALT(U/L)	23.00(18.00~33.00)	25.00(19.00~36.25)	<i>Z</i> =-1.064	0.287
AST/ALT	1.31(1.00~1.66)	1.25(1.00~1.55)	<i>Z</i> =-0.493	0.662
ALP(U/L)	97.00(72.25~140.75)	93.00(72.00~130.75)	<i>Z</i> =-0.420	0.674
GGT(U/L)	27.00(16.00~50.75)	34.50(17.00~56.00)	<i>Z</i> =-1.145	0.252
白蛋白(g/L)	36.84±6.12	35.80±6.02	<i>t</i> =-1.089	0.277
球蛋白(g/L)	28.09±7.24	28.19±5.66	<i>t</i> =0.099	0.921
前白蛋白(g/L)	116.56±41.71	114.38±45.23	<i>t</i> =-0.326	0.745
血清肌酐($\mu\text{mol/L}$)	62.15(53.78~69.78)	59.30(53.70~67.95)	<i>Z</i> =-0.809	0.419
尿酸($\mu\text{mol/L}$)	268.49±115.47	270.22±106.72	<i>t</i> =0.098	0.922
总胆固醇(mmol/L)	2.92(2.36~3.56)	2.89(2.46~3.72)	<i>Z</i> =-0.492	0.623
甘油三酯(mmol/L)	0.84(0.61~1.19)	0.98(0.64~1.37)	<i>Z</i> =-1.407	0.160
凝血酶原时间(s)	15.00(13.73~16.80)	15.35(14.20~17.13)	<i>Z</i> =-1.356	0.175
国际标准化比值	1.26(1.16~1.38)	1.29(1.17~1.41)	<i>Z</i> =-0.914	0.361
活化部分凝血活酶时间(s)	29.45(27.10~34.18)	29.70(26.43~33.58)	<i>Z</i> =-0.439	0.661
凝血酶时间(s)	18.15(17.03~19.45)	18.55(17.18~19.45)	<i>Z</i> =-0.348	0.728
凝血酶原活动度(%)	62.15(53.78~69.78)	59.30(53.70~67.95)	<i>Z</i> =-0.809	0.419
D-二聚体(mg/L)	0.80(0.33~1.92)	0.55(0.28~2.06)	<i>Z</i> =-0.615	0.539
纤维蛋白原(g/L)	1.72(1.20~2.34)	1.87(1.43~2.37)	<i>Z</i> =-1.007	0.314

注:Child-Pugh 分级,蔡尔德-皮尤分级;EIS,内镜下硬化剂注射治疗;EVL,内镜下曲张静脉套扎术;AST,天冬氨酸氨基转移酶;ALT,丙氨酸氨基转移酶;AST/ALT,天冬氨酸氨基转移酶/丙氨酸氨基转移酶比值;ALP,碱性磷酸酶;GGT, γ -谷氨酰转氨酶。

表 2 肝硬化食管胃静脉曲张再出血与未出血患者临床资料比较
Table 2 Clinical data between the rebleeding and no bleeding set

指标	再出血组(<i>n</i> =116)	未出血组(<i>n</i> =78)	统计值	<i>P</i> 值
年龄(岁)	54.34 ± 11.20	55.36 ± 12.10	<i>t</i> =0.604	0.547
性别[例(%)]			$\chi^2=1.699$	0.192
女	47(40.52)	39(50.00)		
男	69(59.48)	39(50.00)		
体重指数(kg/m ²)	22.46 ± 4.04	22.40 ± 3.21	<i>t</i> =-0.119	0.905
家族史[例(%)]			$\chi^2=1.193$	0.275
无	96(82.76)	69(88.46)		
有	20(17.24)	9(11.54)		
吸烟史[例(%)]			$\chi^2=0.065$	0.799
无	72(62.07)	47(60.26)		
有	44(37.93)	31(39.74)		
饮酒史[例(%)]			$\chi^2=1.833$	0.176
无	74(63.79)	57(73.08)		
有	42(36.21)	21(26.92)		
肝硬化病因[例(%)]			$\chi^2=11.344$	0.003
乙型肝炎	90(77.59)	43(55.13)		
自身免疫性	17(14.66)	20(25.64)		
酒精性	9(7.76)	15(19.23)		
门静脉高压治疗史[例(%)]			$\chi^2=0.265$	0.607
无	29(25.00)	17(21.79)		
有	87(75.00)	61(78.21)		
高血压[例(%)]			$\chi^2=6.135$	0.013
无	80(68.97)	66(84.62)		
有	36(31.03)	12(15.38)		
糖尿病[例(%)]			$\chi^2=0.071$	0.791
无	111(95.69)	74(94.87)		
有	5(4.31)	4(5.13)		
Child-Pugh 分级[例(%)]			$\chi^2=6.600$	0.010
A 级	89(76.72)	71(91.03)		
B 级	27(23.28)	7(8.97)		
肝性脑病[例(%)]			$\chi^2=2.353$	0.125
无	107(92.24)	76(97.44)		
有	9(7.76)	2(2.56)		
腹水[例(%)]			$\chi^2=2.586$	0.108
无	36(31.03)	33(42.31)		
有	80(68.97)	45(57.69)		
门静脉高压性胃病[例(%)]			$\chi^2=2.852$	0.091
无	34(29.31)	32(41.03)		
有	82(70.69)	46(58.97)		
门静脉血栓[例(%)]			$\chi^2=5.347$	0.021
无	89(76.72)	70(89.74)		
有	27(23.28)	8(10.26)		
腹膜炎[例(%)]			$\chi^2=0.803$	0.370
无	110(94.83)	76(97.44)		
有	6(5.17)	2(2.56)		

表2(续)

Table 2 (continued)

指标	再出血组(<i>n</i> =116)	未出血组(<i>n</i> =78)	统计值	<i>P</i> 值
电解质紊乱[例(%)]			$\chi^2=1.975$	0.160
无	39(33.62)	34(43.59)		
有	77(66.38)	44(56.41)		
门静脉主干直径(mm)	14.45±3.96	16.40±4.97	<i>t</i> =3.038	0.003
脾静脉直径(mm)	10.38±2.58	11.38±3.37	<i>t</i> =2.352	0.020
门静脉血流速度(cm/s)	10.89±2.32	11.78±2.67	<i>t</i> =2.475	0.014
食管胃静脉曲张程度[例(%)]			$\chi^2=13.580$	0.001
轻度	56(48.28)	58(74.36)		
中度	46(39.66)	18(23.08)		
重度	14(12.07)	2(2.56)		
红色征[例(%)]			$\chi^2=1.003$	0.606
无	25(21.55)	19(24.36)		
有	91(78.45)	59(75.64)		
组织胶用量(mL)	1.50(0.50~1.70)	1.20(0.50~2.00)	<i>Z</i> =-3.246	0.001
治疗方式[例(%)]			$\chi^2=2.344$	0.126
EIS	38(32.76)	34(43.59)		
EIS+EVL	78(67.24)	44(56.41)		
白细胞($\times 10^9/L$)	3.00(2.45~4.76)	3.45(2.42~5.01)	<i>Z</i> =-0.038	0.970
中性粒细胞($\times 10^9/L$)	2.06(1.41~3.89)	2.11(1.53~3.18)	<i>Z</i> =-0.194	0.846
中性粒细胞百分比(%)	0.69±0.12	0.67±0.11	<i>t</i> =-1.085	0.279
淋巴细胞($\times 10^9/L$)	0.70(0.49~1.10)	0.65(0.44~0.90)	<i>Z</i> =-0.253	0.801
单核细胞($\times 10^9/L$)	0.26(0.17~0.44)	0.29(0.17~0.38)	<i>Z</i> =-0.548	0.584
红细胞($\times 10^{12}/L$)	3.54±0.97	3.70±0.86	<i>t</i> =1.144	0.254
血小板($\times 10^{12}/L$)	55.50(41.25~86.25)	58.00(48.75~83.75)	<i>Z</i> =-1.129	0.259
血红蛋白(g/L)	92.12±28.59	102.96±30.40	<i>t</i> =2.525	0.012
总胆红素($\mu\text{mol/L}$)	28.60(20.05~41.68)	27.90(21.00~44.18)	<i>Z</i> =-0.454	0.650
胆碱酯酶(U/L)	3 667.50(2 944.75~4 873.50)	4 074.50(3 122.00~4 316.00)	<i>Z</i> =-0.112	0.911
AST(U/L)	31.00(22.00~44.00)	33.00(23.75~45.75)	<i>Z</i> =-0.574	0.566
ALT(U/L)	23.00(19.00~51.30)	24.50(18.00~50.30)	<i>Z</i> =-0.333	0.739
AST/ALT	1.25(1.00~1.55)	1.39(1.00~1.77)	<i>Z</i> =-1.757	0.079
ALP(U/L)	91.50(70.25~129.50)	102.50(82.75~143.00)	<i>Z</i> =-2.285	0.022
GGT(U/L)	27.00(17.00~48.00)	34.50(17.00~73.25)	<i>Z</i> =-2.256	0.024
白蛋白(g/L)	36.13±6.86	37.13±4.71	<i>t</i> =1.119	0.265
球蛋白(g/L)	27.34±6.15	29.28±7.55	<i>t</i> =1.960	0.051
前白蛋白(g/L)	112.19±40.40	121.44±45.59	<i>t</i> =1.485	0.139
血清肌酐($\mu\text{mol/L}$)	60.00(52.00~71.00)	57.50(49.00~72.25)	<i>Z</i> =-2.950	0.003
尿酸($\mu\text{mol/L}$)	263.04±119.32	277.88±102.06	<i>t</i> =0.899	0.370
总胆固醇(mmol/L)	2.89(2.32~3.73)	3.02(2.61~3.50)	<i>Z</i> =-2.267	0.023
甘油三酯(mmol/L)	0.94(0.65~1.50)	0.70(0.54~1.09)	<i>Z</i> =-3.230	0.001
凝血酶原时间(s)	15.25(13.93~17.00)	15.05(13.68~16.73)	<i>Z</i> =-0.900	0.368
国际标准化比值	1.27(1.17~1.40)	1.26(1.16~1.35)	<i>Z</i> =-0.914	0.360
活化部分凝血活酶时间(s)	31.26±5.78	29.35±4.87	<i>t</i> =-2.399	0.017
凝血酶时间(s)	18.45(17.25~21.19)	17.80(16.80~19.33)	<i>Z</i> =-1.507	0.132
凝血酶原活动度(%)	59.80(52.00~68.05)	63.20(56.53~69.05)	<i>Z</i> =-1.480	0.139
D-二聚体(mg/L)	0.50(0.28~1.40)	1.18(0.42~6.69)	<i>Z</i> =-4.168	<0.001
纤维蛋白原(g/L)	1.64(1.16~1.98)	2.02(1.53~2.65)	<i>Z</i> =-3.318	0.001

注:Child-Pugh 分级,蔡尔德-皮尤分级;EIS,内镜下硬化剂注射治疗;EVL,内镜下曲张静脉套扎术;AST,天冬氨酸氨基转移酶;ALT,丙氨酸氨基转移酶;AST/ALT,天冬氨酸氨基转移酶/丙氨酸氨基转移酶比值;ALP,碱性磷酸酶;GGT, γ -谷氨酰转氨酶。

2.3 对肝硬化食管胃静脉曲张患者再出血风险列线图预测模型的评估 ROC曲线结果显示,在训练集和验证集中,列线图预测模型的曲线下面积(area under the curve, AUC)分别为0.845(95%置信区间:0.778~0.912)




图1 Lasso回归参数选择

Figure 1 Lasso regression parameter selection




图2 交叉验证曲线

Figure 2 Cross-validation

表3 肝硬化食管胃静脉曲张患者发生再出血单因素和多因素 Logistic 回归分析

Table 3 Logistic regression analysis of independent risk factors for rebleeding from esophageal and gastric varices in cirrhosis


变量	单因素			多因素		
	OR	95%CI	P值	OR	95%CI	P值
吸烟(否=0,是=1)	1.033	1.033~1.382	0.003			
肝硬化病因(自身免疫性/酒精性=0,乙型肝炎=1)	5.025	1.213~30.819	0.026	3.540	1.520~7.150	<0.001
Child-Pugh 分级(A级=0,B级=1)	2.530	1.497~12.863	0.026	3.560	1.380~9.500	0.019
血清肌酐($\mu\text{mol/L}$)	1.073	1.013~1.137	0.016			
血小板($\times 10^{12}/\text{L}$)	0.985	0.973~0.997	0.017			
总胆固醇(mmol/L)	1.858	1.740~1.994	0.041			
甘油三酯(mmol/L)	5.418	1.167~25.157	0.031			
GGT(U/L)	0.978	0.965~0.992	0.002			
食管胃静脉曲张程度(轻度/中度=0,重度=1)	7.812	2.563~19.231	0.025	8.190	3.568~17.850	0.026
门静脉主干直径(mm)	1.685	1.521~1.902	0.007	2.954	1.349~15.030	0.044
组织胶用量(mL)	0.907	0.814~1.012	0.097			

注:Child-Pugh 分级,蔡尔德-皮尤分级;GGT, γ -谷氨酰转氨酶;OR,比值比;95%CI,95%置信区间。

和0.801(95%置信区间:0.798~0.868)(表4,图4),一致性指数(C-index)分别为0.832和0.820。校准曲线结果显示,列线图模型预测概率与实际概率具有良好的一致性(图5),Hosmer-Lemeshow 检验显示P值分别为0.320和0.550,说明校准度较好。DCA结果显示,列线图预测模型具有较高的净获益(图6)。CIC结果显示,当阈值概率>0.6时,列线图模型预测的肝硬化食管胃静脉曲张再出血例数与实际肝硬化食管胃静脉曲张再出血例数高度匹配(图7)。

3 讨论

目前,我国治疗EVB的首选方式是内镜治疗^[8-9],该方法具有较高的疗效和安全性。然而,肝硬化EVB患者成功止血后发生再出血和死亡的风险很高,首次食管胃静脉曲张出血停止后1~2年内再次出血的风险为60%~70%,发生死亡的风险高达20%^[7]。



注:Child-Pugh 分级,蔡尔德-皮尤分级。

图3 预测模型的列线图


Figure 3 Nomograph of the prediction model

表4 各变量及联合预测模型评估肝硬化食管胃静脉曲张患者发生再出血的ROC曲线分析

Table 4 ROC curve analysis of variables and combined prediction model for evaluating rebleeding in patients with liver cirrhosis and esophagogastric varices

因素	训练集				验证集			
	AUC(95%CI)	敏感度(%)	特异度(%)	P值	AUC(95%CI)	敏感度(%)	特异度(%)	P值
肝硬化病因	0.718(0.629 ~ 0.807)	95.30	28.30	0.020	0.558(0.531 ~ 0.732)	42.50	76.50	0.031
Child-Pugh 分级	0.574(0.478 ~ 0.670)	78.50	65.30	0.016	0.575(0.456 ~ 0.830)	57.10	75.00	0.020
门静脉主干直径	0.732(0.642 ~ 0.822)	28.80	46.50	0.039	0.530(0.413 ~ 0.630)	40.00	64.50	0.023
食管胃静脉曲张程度	0.621(0.525 ~ 0.717)	86.00	82.80	0.016	0.561(0.560 ~ 0.871)	60.00	64.70	0.020
联合预测	0.845(0.778 ~ 0.912)	90.60	79.10	0.002	0.801(0.798 ~ 0.868)	94.60	83.90	0.004

注:ROC曲线,受试者操作特征曲线;Child-Pugh 分级,蔡尔德-皮尤分级;AUC,曲线下面积;95%CI,95%置信区间。




注:a,训练集;b,验证集。Child-Pugh 分级,蔡尔德-皮尤分级;GOV,食管胃静脉曲张程度;MPV,门静脉主干直径。

图4 受试者操作特征曲线

Figure 4 Receiver operator characteristic curve

Baveno VII指南推荐将EVL与非选择性 β 受体阻滞剂联合应用作为预防静脉曲张再出血的一线疗法^[3]。然而,一项荟萃分析显示,标准二级预防措施后的再出血率仍高达22%~33%^[10]。本研究基于194例肝硬化EVB患者经内镜治疗后1年随访数据,构建风险预测模




注:a,训练集;b,验证集。

图5 校准曲线

Figure 5 Calibration curve

型,旨在帮助临床医生识别接受内镜治疗后肝硬化合并消化道再出血的高风险人群,以指导临床决策。

本研究结果显示,Child-Pugh 分级、肝硬化病因、食管胃静脉曲张程度和门静脉主干直径是肝硬化食管胃静脉曲张破裂再出血的危险因素;在训练集和验证集中,上述4个临床参数构建的列线图模型的AUC分别为




注:a,训练集;b,验证集。

图6 临床决策曲线分析

Figure 6 Clinical decision curve analysis

0.845和0.801,表明该模型具有良好的预测性能。列线图模型在训练集和验证集的C-index均 >0.8 , Hosmer-Lemeshow检验 P 值均 >0.05 ,提示该模型具有良好的拟和度;DCA和CIC结果均表明该模型具有良好的临床效能,为早期识别肝硬化食管胃静脉曲张再出血患者提供了一定的临床依据。

食管胃静脉曲张是肝硬化患者最常见的并发症之一,也是导致患者死亡的重要原因。该病症的形成主要源于门静脉高压,而胸腔负压作用可进一步增加静脉回流量,加重静脉曲张程度。研究发现,EVB患者中食管胃静脉曲张的严重程度与再出血风险之间存在显著的正相关关系,这一现象可能与门静脉压力的增加密切相关^[11]。本研究发现,食管胃静脉曲张严重程度在未出血组与再出血组中也显示出显著差异($P=0.001$),未出血组中重度食管胃静脉曲张占比为2.56%,而在再出血组中重度食管胃静脉曲张占比为12.07%,提示食管胃静



注:a,训练集;b,验证集。

图7 临床影响曲线

Figure 7 Clinical impact curve

脉曲张的严重程度与再出血风险存在紧密联系。重度曲张者更易导致血管壁薄弱、血流淤滞及局部微血栓形成,加剧破裂风险。因此,对重度食管胃静脉曲张患者需密切随访,并在必要时予以积极干预,如联合应用降门静脉压药物与内镜治疗,以降低再出血风险。

对于EVB患者,门静脉高压是食管胃静脉曲张形成和破裂出血的主要原因,压力越高,出血风险越大。研究表明,门静脉内径可间接反映门静脉压力,两者间具有显著相关性^[12]。门静脉直径增宽的患者,其门静脉压力越高,静脉曲张越严重,发生出血及再出血的可能性也越高。门静脉高压是肝硬化的主要病理生理变化,发病机制较复杂,涉及肝内血管阻力增加、门静脉血流量增多、门静脉侧支循环开放等^[13]。内镜下治疗操作不当或治疗不彻底可能导致止血效果不佳,从而增加再出血风险。本研究的内镜治疗由2名统一培训的高年资内镜医师完成,部分患者在内镜治疗后仍发生再出血,除与患者自身肝功能储备、门静脉压力、曲张静脉程度等因

素有关外,操作者的经验及手术时机的选择同样对控制急性出血和预防再出血至关重要。由接受过规范培训且年操作量较大的医师实施治疗,可显著降低再出血率。此外,患者术后用药依从性不佳(如未按规定使用质子泵抑制剂等抑酸药物),或治疗后早期进食过硬、过热及刺激性食物,均可能诱发再出血。

目前,我国肝硬化的主要病因为病毒性肝炎。在本研究中,68.56%的肝硬化患者主要病因为乙型肝炎,其余为酒精性和自身免疫性肝病。不同病因对肝硬化食管胃静脉曲张再出血的影响可能是通过各自的病理生理机制,影响肝病的进展、肝外表现及对治疗的反应。有效的抗病毒治疗可以抑制病毒复制、减轻肝脏炎症、延缓甚至逆转肝纤维化,从而从病因上降低门静脉压力,减少再出血风险。自身免疫性肝病其自然病程和治疗反应不同,也可能影响血管曲张的进展速度^[14-16]。上述发现提示,病因治疗在二级预防中具有核心地位。对于可控制的病因(如病毒、酒精),将再出血预防与病因治疗紧密结合,是改善患者长期预后的根本。

Child-Pugh分级是评估肝脏储备功能和全身状况的经典指标,分级越高提示肝功能损害越严重,肝内阻力增加及内脏高动力循环更显著,导致门静脉压力持续升高,这是再出血的根本血流动力学基础。Child-Pugh C级曲张静脉相较于Child-Pugh A、B级也更为严重,再出血风险更高,肝脏合成能力下降,凝血因子和抗纤溶物质合成减少,导致止血功能严重受损,出血不易停止且容易复发。腹水、感染(如自发性腹膜炎)等并发症常见于高分级患者,上述情况可进一步增加门静脉压力或诱发出血^[17-18]。

本研究亦存在局限性。首先,这是一项单中心回顾性研究,可能存在选择偏倚,研究人群来自单一机构,可能无法充分代表所有患者的临床情况。其次,样本量相对较小,研究结果需要通过更大规模的多中心研究进一步验证,以提高其普遍性和可靠性。再次,未对纳入的实验室指标进行动态分析,不能准确反映病情变化。最后,由于所在医院医疗设备资源有限,未纳入门静脉压力、肝硬度、脾硬度等数据。未来若能纳入上述数据,可能会进一步提高模型的预测价值。

综上所述,本研究基于肝硬化食管胃静脉曲张患者易获取的临床资料(Child-Pugh分级、肝硬化病因、食管胃静脉曲张程度、门静脉主干直径),构建了一个预测模型。该模型在训练集与验证集中均表现出良好的区分度、校准度及预测效能,能够有效评估肝硬化食管胃静

曲张患者的再出血风险,有助于医师早期干预并改善患者预后。未来需进行多中心、大样本的研究对该预测模型进行验证。

伦理学声明: 本研究方案经由兰州市第二人民医院伦理委员会审批,批号:P-LW2026060003。

利益冲突声明: 本文不存在任何利益冲突。

作者贡献声明: 邵慧娟负责设计论文框架,起草论文;韩世妮、张爱萍负责统计学分析,绘制图表;张玉玲、李挺和韩亚负责数据收集;窦文杉、王秀霞负责论文修改;杜宏伟、张久聪负责拟定写作思路,指导撰写文章并最后定稿。

参考文献:

- [1] Garcia-Tsao G, Abraldes J G, Berzigotti A, et al. Portal hypertensive bleeding in cirrhosis: Risk stratification, diagnosis, and management: 2016 practice guidance by the American Association for the Study of Liver Diseases[J]. *Hepatology*, 2017, 65(1): 310-335. DOI: 10.1002/hep.28906.
- [2] Jakab S S, Garcia-Tsao G. Evaluation and management of esophageal and gastric varices in patients with cirrhosis[J]. *Clin Liver Dis*, 2020, 24(3): 335-350. DOI: 10.1016/j.cld.2020.04.011.
- [3] de Franchis R, Bosch J, Garcia-Tsao G, et al. Baveno VII-Renewing consensus in portal hypertension[J]. *J Hepatol*, 2022, 76(4): 959-974. DOI: 10.1016/j.jhep.2021.12.022.
- [4] Zhan J Y, Chen J, Yu J Z, et al. Prognostic model for esophagogastric variceal rebleeding after endoscopic treatment in liver cirrhosis: A Chinese multicenter study[J]. *World J Gastroenterol*, 2025, 31(2): 100234. DOI: 10.3748/wjg.v31.i2.100234.
- [5] Li J, Li J, Ji Q, et al. Nomogram based on spleen volume expansion rate predicts esophagogastric varices bleeding risk in patients with hepatitis B liver cirrhosis[J]. *Front Surg*, 2022, 9: 1019952. DOI: 10.3389/fsurg.2022.1019952.
- [6] 中华医学会外科学分会脾及门静脉高压外科组. 肝硬化门静脉高压症食管、胃底静脉曲张破裂出血诊治专家共识(2025版)[J]. *中华消化外科杂志*, 2025, 24(3): 271-280. DOI: 10.3760/cma.j.cn115610-20241228-00590. Chinese Society of Spleen and Portal Hypertension Surgery, Chinese Society of Surgery, Chinese Medical Association. Expert consensus on the diagnosis and treatment of esophageal and gastric variceal rupture bleeding in cirrhotic portal hypertension (2025 edition) [J]. *Chin J Dig Surg*, 2025, 24(3): 271-280. DOI: 10.3760/cma.j.cn115610-20241228-00590.
- [7] 中华医学会肝病学会, 中华医学会消化病学分会, 中华医学会消化内镜学分会. 肝硬化门静脉高压食管胃静脉曲张出血的防治指南[J]. *临床肝胆病杂志*, 2023, 39(3): 527-538. Chinese Society of Hepatology, Chinese Society of Gastroenterology, Chinese Society of Digestive Endoscopy of Chinese Medical Association. Guidelines on the management of esophagogastric variceal bleeding in cirrhotic portal hypertension[J]. *J Clin Hepatol*, 2023, 39(3): 527-538.
- [8] Zhang W H, Wang Y L, Chu J D, et al. Investigation report on endoscopic management of esophagogastric variceal bleeding by Chinese endoscopists[J]. *Medicine*, 2022, 101(42): e31263. DOI: 10.1097/MD.00000000000031263.
- [9] 李鑫会, 祁兴顺, 王静, 等. 肝硬化食管胃静脉曲张内镜管理质量控制体系构建与优化[J]. *临床军医杂志*, 2026, 54(1): 1-5, 10. DOI: 10.16680/j.1671-3826.2026.01.01.

- Li Xinhui, Qi Xingshun, Wang Jing, et al. Construction and optimization of a quality control system for endoscopic management of esophageal and gastric varices in cirrhosis[J]. Clin J Med Off, 2026, 54(1): 1-5, 10. DOI: 10.16680/j.1671-3826.2026.01.01.
- [10] Yang J, Ge K, Chen L, et al. The efficacy comparison of carvedilol plus endoscopic variceal ligation and traditional, nonselective β -blockers plus endoscopic variceal ligation in cirrhosis patients for the prevention of variceal rebleeding: A meta-analysis[J]. Eur J Gastroenterol Hepatol, 2019, 31(12): 1518-1526. DOI: 10.1097/MEG.0000000000001442.
- [11] Duan X W, He X, Yan H Z, et al. Analysis of complications and risk factors other than bleeding before and after endoscopic treatment of esophagogastric variceal bleeding in patients with liver cirrhosis[J]. Can J Gastroenterol Hepatol, 2023, 2023: 7556408. DOI: 10.1155/2023/7556408.
- [12] Wu L, Fang Q Q, Huang X Q, et al. Risk factors associated with failure of endoscopic combined treatment to prevent varices rebleeding in patients with liver cirrhosis[J]. Expert Rev Gastroenterol Hepatol, 2023, 17(3): 301-308. DOI: 10.1080/17474124.2023.2181787.
- [13] Tao K, Shan X, He B B, et al. Sequential endoscopic treatment for esophageal and gastric variceal bleeding significantly reduces patient mortality and rebleeding rates[J]. Ther Adv Gastroenterol, 2024, 17: 17562848241299743. DOI: 10.1177/17562848241299743.
- [14] Ding S Y, Lu S Y, Cui L Y, et al. Association between duration of alcohol consumption and risk of hematemesis in patients with alcoholic cirrhosis complicated by esophagogastric variceal bleeding: A case-control study[J]. BMC Gastroenterol, 2025, 25(1): 849. DOI: 10.1186/s12876-025-04444-3.
- [15] Taleb A, Ibrahim M. Gastrointestinal bleeding in liver cirrhosis[M]// Recent advances in liver cirrhosis related complications. Academic Press, 2025: 59-69.
- [16] Lin C C, Huang Y S. Portal vein thrombosis and esophageal-gastric variceal bleeding in cirrhosis: Shared risk factors and causal relationship[J]. BMC Gastroenterol, 2025, 25(1): 500. DOI: 10.1186/s12876-025-04094-5.
- [17] 杨建波, 黄小梅, 何远静, 等. 食管胃底静脉曲张破裂出血内镜治疗效果及1年内再出血风险预测模型的构建及验证[J]. 四川大学学报(医学版), 2025, 56(1): 284-290. DOI: 10.12182/20250160106. Yang Jianbo, Huang Xiaomei, He Yuanjing, et al. Outcomes of endoscopic treatment of esophagogastric variceal bleeding and construction and validation of a 1-year rebleeding risk prediction model[J]. J Sichuan Univ Med Sci, 2025, 56(1): 284-290. DOI: 10.12182/20250160106.
- [18] 朱颖静, 吴洁, 田鑫越, 等. 内镜下组织胶注射治疗乙型肝炎肝硬化食管胃底静脉曲张破裂出血患者疗效分析[J]. 实用肝脏病杂志, 2025, 28(5): 731-734. DOI: 10.3969/j.issn.1672-5069.2025.05.023. Zhu Yingjing, Wu Jie, Tian Xinyue, et al. Endoscopic tissue glue injection and esophageal variceal ligation in treatment of patients with hepatitis B-induced liver cirrhosis and esophageal and gastric varices bleeding[J]. J Pract Hepatol, 2025, 28(5): 731-734. DOI: 10.3969/j.issn.1672-5069.2025.05.023.

收稿日期: 2026-01-11; 录用日期: 2026-04-27

本文编辑: 葛俊

引证本文: 邵慧娟, 韩世妮, 张爱萍, 等. 肝硬化食管胃静脉曲张内镜下治疗后再出血的危险因素分析及列线图模型构建[J]. 临床肝胆病杂志, 2026, 42(8): 1845-1856. Shao Huijuan, Han Shini, Zhang Aiping, et al. Risk factors for rebleeding after endoscopic therapy for esophageal and gastric varices in liver cirrhosis patients and construction of a nomogram model[J]. J Clin Hepatol, 2026, 42(8): 1845-1856.

读者·作者·编者

《临床肝胆病杂志》关于论文表格与插图自明性的要求

为确保期刊的学术质量,提升论文的可读性与传播效率,根据中华人民共和国新闻出版行业标准《CY/T 170—2019 学术出版规范 表格》《CY/T 171—2019 学术出版规范 插图》及国际生物医学期刊编辑惯例,《临床肝胆病杂志》对投稿论文中插图和表格的自明性作如下规定。

一、自明性的定义

“自明性”是指所有表格、插图(包括照片、数据图等)应被视为论文的独立信息单元,读者无需阅读正文,仅通过其自身的各个构成要素,即可清晰、准确地理解其所传达的核心信息、数据结果及重要结论。

二、具体要求

1. 表题/图题:应简明、完整反映图表的核心内容,中英文对照。表序/图序按照在正文中出现的顺序连续编号。
2. 缩略语:表格/插图(含表题、图题在内)自身使用的所有英文缩略语,应以表注或图注形式标注“英文缩略语,中文全称”,按照出现顺序依次标注,多个标注以分号分隔,注文末尾应用句号。示例:注:ALT,丙氨酸氨基转移酶。本刊仅认定DNA(脱氧核糖核酸)、RNA(核糖核酸)为公知公认的英文缩略语,可直接使用。
3. 符号/标记:表格/插图中出现的所有符号(如*、#、△)、线条样式(如实线、虚线)以及颜色标记,须在表注/图注区域解释对应含义。
4. 项目/标目:表格栏目应标明变量的名称和单位。数据图应标明坐标轴标目的名称和单位,标值、坐标原点应标注完整、规范、统一。
5. 数据/技术:表格中同一行数据的修约数位应一致。组织切片、影像学图片等应注明染色方法和放大倍数。