

高尔基体蛋白73对可切除肝细胞癌患者肝纤维化程度及预后的评估价值

霍婉莹¹, 何 华^{1,2}, 于馨一³, 贺迈漫¹, 姜 晶¹

1 吉林大学第一医院临床研究部, 长春 130021

2 吉林大学第一医院肿瘤中心, 长春 130021

3 吉林大学公共卫生学院, 长春 130021

通信作者: 姜晶, jiangjing19702000@jlu.edu.cn (ORCID: 0000-0001-9714-9255)

摘要: **目的** 评估术前血清高尔基体蛋白73(GP73)在可切除肝细胞癌(HCC)患者中诊断肝纤维化程度的效能,并探讨其对术后生存的预测作用,以期为该人群的风险分层与个体化决策提供依据。**方法** 纳入2009年3月1日—2022年12月31日于吉林大学第一医院接受肝切除手术的HCC患者631例。收集患者的人口学、病理学及血清学特征,并检测术前血清GP73水平。以病理Scheuer评分为肝纤维化诊断的金标准,采用Spearman相关分析评估GP73与肝纤维化的相关性,应用受试者操作特征曲线及曲线下面积(AUC)评估血清GP73与血清学复合标志物对肝纤维化的诊断价值,AUC的比较采用Delong检验。以全因死亡为预后结局,通过X-Tile 3.6.1软件确定GP73的最佳截断值,采用单因素和多因素Cox回归分析确定预后独立影响因素,并构建列线图模型。采用10折交叉验证评估模型的内部一致性,计算一致性指数(C-index)、综合判别改善指数(IDI)、净重分类改善指数(NRI),并绘制校准曲线及决策曲线分析评估模型的预测效能。**结果** 血清GP73水平与肝纤维化分期呈正相关($r_s=0.255, P<0.001$)。血清GP73诊断显著肝纤维化的AUC为0.704,显著优于 γ -谷氨酰转移酶/血小板比值(AUC=0.634, $Z=2.00, P=0.046$)和S指数(AUC=0.637, $Z=1.98, P=0.048$);与天冬氨酸氨基转移酶/血小板比值指数(AUC=0.722)及纤维化-4指数(AUC=0.695)相比,差异均无统计学意义(P 值均 >0.05)。HCC患者术后中位随访时间为48.66个月,累计死亡239例(37.9%)。GP73预测可切除HCC患者术后死亡的最佳截断值为65 ng/mL,GP73高表达(≥ 65 ng/mL)单独预测HCC患者预后的C-index为0.617,优于临床常用的巴塞罗那肝癌临床分期(BCLC分期)(C-index=0.551, $P<0.001$)。多因素Cox回归分析显示,血清GP73[风险比(hazard ratio, HR)=2.56, 95%置信区间(confidence interval, CI): 1.86~3.52, $P<0.001$]、性别(HR=1.58, 95%CI: 1.10~2.28, $P=0.014$)、脉管浸润(HR=1.69, 95%CI: 1.30~2.21, $P<0.001$)、总胆红素(HR=1.49, 95%CI: 1.16~1.93, $P=0.002$)及肿瘤最大径(HR=1.07, 95%CI: 1.04~1.11, $P<0.001$)是HCC患者肝切除术后全因死亡的独立危险因素。为评价在其余4个预测变量基础上加入GP73能否改善模型性能,将纳入GP73、性别、脉管浸润、总胆红素和肿瘤最大径的模型定义为含GP73模型;此外,在保留性别、脉管浸润、总胆红素和肿瘤最大径4个变量的基础上剔除GP73,构建不含GP73模型。结果显示,含GP73模型预测HCC患者术后5年生存率的AUC为0.704(95%CI: 0.656~0.753), 10折交叉验证平均C-index为0.716(95%CI: 0.682~0.750),高于不含GP73模型(C-index=0.682, 95%CI: 0.645~0.719, $P=0.008$)和BCLC分期(C-index=0.551, 95%CI: 0.523~0.580, $P<0.001$)。与不含GP73模型相比,含GP73模型的IDI为0.039(95%CI: 0.016~0.069, $P<0.001$), NRI为0.259(95%CI: 0.179~0.335, $P<0.001$);与BCLC分期相比,含GP73模型的IDI为0.112(95%CI: 0.069~0.163, $P<0.001$), NRI为0.272(95%CI: 0.169~0.380, $P<0.001$)。校准曲线和决策曲线分析显示,含GP73模型具有良好的校准度和临床净获益。**结论** GP73能够作为可切除HCC患者肝纤维化诊断的血清学标志物,其术前水平对HCC患者肝切除术后生存具有一定预测价值。基于GP73构建的综合预后模型有助于优化术后风险分层,为HCC精准医疗提供决策依据。

关键词: 癌, 肝细胞; 高尔基体蛋白73; 肝纤维化; 预后; 列线图

基金项目: 青年科学基金项目(82204116)

Value of Golgi protein 73 in assessing liver fibrosis degree and prognosis of patients with resectable hepatocellular carcinoma

Huo Wanying¹, He Hua^{1,2}, Yu Xinyi³, He Maiman¹, Jiang Jing¹

1. Division of Clinical Research, The First Hospital of Jilin University, Changchun 130021, China; 2. Cancer Center, The First Hospital of Jilin University, Changchun 130021, China; 3. School of Public Health, Jilin University, Changchun 130021, China

Corresponding author: Jiang Jing, jiangjing19702000@jlu.edu.cn (ORCID: 0000-0001-9714-9255)

Abstract: Objective To assess the performance of preoperative serum Golgi protein 73 (GP73) in diagnosing liver fibrosis degree in patients with resectable hepatocellular carcinoma (HCC), to investigate its value in predicting postoperative survival, and to provide a basis for risk stratification and individualized decision-making in this population. **Methods** A total of 631 patients with HCC who underwent liver resection at The First Hospital of Jilin University from March 1, 2009 to December 31, 2022 were enrolled. The demographic, pathological, and serological features of the patients were collected, and the serum level of GP73 was measured before surgery. Scheuer score determined by liver biopsy was used as the gold standard for diagnosing liver fibrosis; the Spearman correlation analysis was used to investigate the correlation between GP73 and liver fibrosis; the receiver operating characteristic (ROC) curve and the area under the ROC curve (AUC) were used to assess the value of serum GP73 and compound serological markers in the diagnosis of liver fibrosis, and the Delong test was used for comparison of AUC. With all-cause mortality as the outcome, X-Tile 3.6.1 software was used to determine the optimal cut-off value of GP73; the univariate and multivariate Cox regression analyses were used to identify independent influencing factors for prognosis, and a nomogram model was constructed. Ten-fold cross-validation was used for internal validation; index of concordance (C-index), integrated discrimination improvement (IDI) index, and net reclassification improvement (NRI) index were calculated; calibration curve and decision curve analysis were used to assess the predictive performance of the model. **Results** The serum level of GP73 was positively correlated with Scheuer liver fibrosis stage ($r_s=0.255$, $P<0.001$). Serum GP73 had a significantly higher AUC than gamma-glutamyl transferase-to-platelet ratio (0.704 vs 0.634, $Z=2.00$, $P=0.046$) and S index (0.704 vs 0.637, $Z=1.98$, $P=0.048$) in the diagnosis of significant liver fibrosis, with no significant difference compared with aspartate aminotransferase-to-platelet ratio index (AUC=0.722) and fibrosis-4 index (AUC=0.695) (both $P>0.05$). During a median follow-up time of 48.66 months, 239 patients (37.9%) died. GP73 had an optimal cut-off value of 65 ng/mL in predicting postoperative mortality in patients with resectable HCC, and high GP73 expression (≥ 65 ng/mL) alone achieved a C-index of 0.617 for predicting the prognosis of HCC patients, which was better than the C-index of 0.551 for Barcelona Clinic Liver Cancer (BCLC) stage ($P<0.001$). The multivariate Cox regression analysis showed that serum GP73 (hazard ratio [HR]=2.56, 95% confidence interval [CI]: 1.86—3.52, $P<0.001$), sex (HR=1.58, 95%CI: 1.10—2.28, $P=0.014$), vascular invasion (HR=1.69, 95%CI: 1.30—2.21, $P<0.001$), total bilirubin (HR=1.49, 95%CI: 1.16—1.93, $P=0.002$), and maximum tumor diameter (HR=1.07, 95%CI: 1.04—1.11, $P<0.001$) were independent risk factors for all-cause mortality after hepatectomy in patients with HCC. In order to assess whether the addition of GP73 to the other four variables could further improve model performance, the model based on GP73, sex, vascular invasion, total bilirubin, and maximum tumor diameter was defined as the GP73-included model, and the model based on all five variables except GP73 was defined as the GP73-excluded model. The GP73-included model achieved an AUC of 0.704 (95%CI: 0.656—0.753) for predicting 5-year survival rate after surgery, and ten-fold cross-validation showed that this model had a mean C-index of 0.716 (95%CI: 0.682—0.750), which was higher than the C-index of the GP73-excluded model (C-index=0.682, 95%CI: 0.645—0.719, $P=0.008$) and BCLC stage (C-index=0.551, 95%CI: 0.523—0.580, $P<0.001$). Compared with the GP73-excluded model, the GP73-included model yielded an IDI index of 0.039 (95%CI: 0.016—0.069, $P<0.001$) and an NRI index of 0.259 (95%CI: 0.179—0.335, $P<0.001$), and compared with BCLC stage, the GP73-included model had an IDI index of 0.112 (95%CI: 0.069—0.163, $P<0.001$) and an NRI index of 0.272 (95%CI: 0.169—0.380, $P<0.001$). Calibration curve and decision curve analyses showed that the GP73-included model had good calibration and net clinical benefit. **Conclusion** GP73 can be used as a serological biomarker for diagnosing liver fibrosis in patients with resectable HCC, and preoperative GP73 level has a certain value in predicting the survival of these patients after hepatectomy. The integrated prognostic model incorporating

GP73 can help to optimize postoperative risk stratification, thereby providing a basis for decision-making in precise treatment of HCC.

Key words: Carcinoma, Hepatocellular; Golgi Protein 73; Hepatic Fibrosis; Prognosis; Nomograms

Research funding: Youth Science Foundation Project (82204116)

肝细胞癌(hepatocellular carcinoma, HCC)是全球六大常见癌症之一,其死亡率位居癌症相关死因第三位,公共卫生负担持续加重^[1]。肝切除术是目前获得长期生存的主要根治性手段^[2],但在可切除HCC人群中,患者术后生存结局存在较大异质性,提示现有风险分层工具在指导围手术期精准决策和个体化预后评估方面尚存在不足^[3]。

术前精准评估肝纤维化程度对制定合理的手术策略、改善患者预后至关重要。肝硬化阶段的患者因残余肝功能储备不足,切除范围受限;若能在纤维化等可逆性阶段予以准确识别并及时干预,则有望扩大手术人群并改善预后^[4-5]。然而,现有肝纤维化评估手段存在明显局限:肝脏活组织检查具有侵袭性,临床应用受限;影像学检查易受肥胖、炎症活动等因素影响;多种血清学评分[如天冬氨酸氨基转移酶/血小板比值指数(aspartate aminotransferase to platelet ratio index, APRI)]在可切除HCC患者中的准确性和适用性仍存在争议^[6-7]。在预后评估方面,当前国际广泛应用的预后评估工具,包括巴塞罗那肝癌临床分期(Barcelona clinic liver cancer staging, BCLC分期)和美国癌症联合会原发肿瘤-区域淋巴结-远处转移分期(tumor node metastasis classification, TNM分期),对肝纤维化程度及残余肝功能储备的影响考虑不足,导致不同分期体系对可切除HCC患者术后生存的预测结果存在显著差异,难以满足精准预后评估的需求^[8]。因此,亟需发掘兼具肝纤维化评估与预后分层能力的新型生物学标志物,以实现纤维化的无创评估并优化预后判断^[9]。

高尔基体蛋白73(Golgi protein 73, GP73)是一种主要表达于肝细胞高尔基体膜的跨膜糖蛋白^[10]。既往研究表明,血清GP73水平不仅与肝纤维化分期密切相关,亦与HCC的肿瘤生物学特征存在关联,显示出其作为潜在生物标志物的重要价值^[11]。然而,目前关于GP73的研究仍存在一定局限性。首先,多数肝纤维化诊断的研究对象为单纯慢性肝病患者,缺乏针对接受肝切除术的可切除HCC人群的系统评估;其次,既往研究仅将GP73分别作为肝纤维化诊断指标或肿瘤标志物进行评估,鲜有在同一可切除HCC队列中同时评估其对肝纤维化及术后生存的双重预测价值。此外,在整合肿瘤负荷、肝

功能等传统风险因素后,GP73能否提供独立的增量预后价值,也是待解决的关键问题^[12]。

因此,本研究旨在系统评估GP73在可切除HCC患者肝纤维化诊断及术后预后评估中的价值,并构建整合GP73的综合评估模型,为优化该人群的个体化风险分层提供关键证据。

1 资料与方法

1.1 研究对象 本研究基于吉林大学第一医院前瞻性肝癌随访队列,纳入该队列中2009年3月1日—2022年12月31日首次接受根治性肝切除术并留存术前血清标本的全部HCC患者。纳入标准:(1)经肝组织病理确诊为HCC;(2)行根治性肝切除术,且术前未接受抗肿瘤治疗;(3)具有冻存的术前血清标本。排除标准:(1)存在远处转移或手术切缘阳性;(2)合并其他恶性肿瘤;(3)合并严重心、肺、肾、血液疾病或严重脑病;(4)初次随访即失访;(5)缺乏肝纤维化病理分级资料。入组筛选流程详见图1。




图1 入组流程图

Figure 1 Enrollment flowchart

1.2 资料收集 收集患者的人口统计学、临床和病理数据,具体包括年龄、性别、手术时间及方式、肝炎病毒感染类型、全血细胞计数、凝血功能、肝功能检查、肝纤维化程度、肿瘤大小及数目等。其中,肝纤维化程度、脉管浸润、神经浸润及组织学分化依据术后病理结果确定;其余指标则以入院后、术前最近一次检查结果为准。

肝纤维化程度采用病理Scheuer评分系统对手术切除的肝脏标本进行评估,根据其临床意义,将 $\geq S2$ 评定为

显著肝纤维化, $\geq S4$ 评定为肝硬化^[13]。

血清学肝纤维化评估指标包括 APRI、纤维化-4 指数(fibrosis-4 index, FIB-4 指数)、 γ -谷氨酰转氨酶/血小板比值(gamma glutamyltransferase to platelet ratio, GPR)及 S 指数,具体计算公式参考既往文献^[14]。

1.3 GP73、甲胎蛋白(alpha fetoprotein, AFP)、甲胎蛋白异质体 L3 百分比(AFP-L3%)及异常凝血酶原(des-gamma-carboxy prothrombin, DCP)的检测 所有患者于术前当日采集空腹(>8 h)外周血,血清标本均于 -80°C 冻存。对纳入患者的术前血清学样本进行检测,采用磁微粒化学发光免疫分析试剂盒(北京热景生物技术股份有限公司),通过 Hotgen MQ60plus 自动免疫分析仪检测血清中 GP73、AFP、DCP 浓度及 AFP-L3%。所有操作均严格遵循试剂盒及仪器说明书要求。

1.4 研究结局定义 所有患者出院后接受系统性随访,术后第 1 年于 3、6、12 个月随访 1 次,此后每年电话随访 1 次,直至患者死亡、失访或研究截止日期(2025 年 4 月 30 日)。

生存结局信息通过门诊复诊、电话随访及国家死亡登记系统获取。本研究的主要结局指标为总生存期,其定义为自肝切除手术日期至任何原因所致死亡或末次随访日期的时间间隔。

1.5 统计学方法 采用 SPSS 25.0、R 4.4.3 和 X-Tile 3.6.1 软件对数据进行统计分析。计量资料均呈非正态分布,以 $M(P_{25} \sim P_{75})$ 表示。计数资料两组间比较采用 χ^2 检验或 Fisher 确切检验。采用 Spearman 相关分析法,评估血清 GP73 水平与肝纤维化程度之间的相关性。应用受试者操作特征曲线(receiver operating characteristic curve, ROC 曲线)及曲线下面积(area under the curve, AUC)评价血清 GP73 与血清学复合标志物的诊断效能, AUC 的比较采用 Delong 检验。

在预后分析中,采用 X-Tile 3.6.1 软件确定最佳截断值,并通过 Kaplan-Meier 法与 Log-rank 检验比较生存差异。单因素 Cox 比例风险回归模型用于初步筛选潜在预测因子,将具有统计学意义的变量通过 Schoenfeld 残差检验比例风险假设,并利用方差膨胀因子评估变量间的共线性。多因素 Cox 回归分析(向后逐步法)用于确定最终预测模型,并以列线图进行可视化展示。通过 10 折交叉验证评估模型的内部一致性,计算一致性指数(concordance index, C-index)以评估其区分度,采用时间依赖性 ROC 曲线评估预测性能,校准曲线用于检验准确性,决策曲线分析评估临床实用性。 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 研究对象的基线特征 本研究共纳入 631 例接受根治性肝切除的 HCC 患者,其中年龄 ≥ 60 岁者 234 例(37.1%),男 496 例(78.6%)。多数患者合并乙型肝炎病毒感染(81.9%),肿瘤呈单发病灶(80.8%),病理分级为中分化(67.5%),Scheuer 评分为 S4(肝硬化)者占 65.6%。患者的基线临床及病理学特征见表 1。

2.2 血清 GP73 对肝纤维化程度的诊断价值 血清 GP73 水平随着肝纤维化程度的加重而显著升高($r_s = 0.255, P < 0.001$)(图 2)。ROC 曲线分析结果显示,在显著肝纤维化诊断中,GP73 的 AUC 为 0.704(敏感度 62.8%,特异度 71.8%),其诊断效能显著优于 GPR(AUC=0.634)和 S 指数(AUC=0.637)(Z 值分别为 2.00、1.98, P 值分别为 0.046、0.048),而与 APRI(AUC=0.722)及 FIB-4(AUC=0.695)相比,差异均无统计学意义(P 值均 >0.05);在肝硬化诊断中,GP73 的 AUC 为 0.638(敏感度 72.6%,特异度 49.0%),与 FIB-4(AUC=0.676)、GPR(AUC=0.634)及 S 指数(AUC=0.634)相比,差异均无统计学意义(P 值均 >0.05),但 GP73 的 AUC 低于 APRI(AUC=0.688),差异有统计学意义($Z = -1.99, P = 0.047$)(图 3)。

2.3 血清 GP73 对 HCC 患者预后的评估价值 HCC 患者术后中位随访时间为 48.66 个月,累计死亡 239 例(37.9%)。依据 X-Tile 3.6.1 软件确定最佳截断值为 65 ng/mL,将患者分为 GP73 高表达组(≥ 65 ng/mL, $n = 396$)与 GP73 低表达组(< 65 ng/mL, $n = 235$)。血清 GP73 预测 HCC 患者术后总生存期的 C-index 为 0.617[95% 置信区间(confidence interval, CI): 0.589 ~ 0.645],显著高于 BCLC 分期(C-index=0.551, 95%CI: 0.523 ~ 0.580, $P < 0.001$)、AFP(C-index=0.555, 95%CI: 0.522 ~ 0.588, $P = 0.016$)、AFP-L3%(C-index=0.553, 95%CI: 0.516 ~ 0.588, $P = 0.013$)和 DCP(C-index=0.554, 95%CI: 0.523 ~ 0.585, $P = 0.003$)。

与 GP73 低表达组相比,GP73 高表达组患者的乙型肝炎病毒感染比例更高,蔡尔德-皮尤分级(Child-Pugh 分级)更差,肝硬化比例更高,肿瘤最大径 ≥ 5 cm、低分化及存在脉管浸润的比例均显著增加(P 值均 <0.05)(表 2)。GP73 高表达组术后 5 年总生存率显著低于低表达组(51.2% vs 76.8%, $\chi^2 = 46.54, P < 0.001$)。与 GP73 低表达组相比,GP73 高表达组患者的死亡风险显著增加(风险比=2.84, 95%CI: 2.08 ~ 3.89, $P < 0.001$)。根据 BCLC 分期进行的分层分析显示,在各分期患者中,GP73 高表达


表1 HCC患者基线特征
Table 1 Subject characteristics of HCC patients

变量	数值	变量	数值
年龄[例(%)]		神经浸润[例(%)]	
<60岁	397(62.9)	否	627(99.4)
≥60岁	234(37.1)	是	4(0.6)
性别[例(%)]		Scheuer评分[例(%)]	
男	496(78.6)	S0~1	88(13.9)
女	135(21.4)	S2	78(12.4)
Child-Pugh分级[例(%)]		S3	51(8.1)
A级	569(90.2)	S4	414(65.6)
B级	62(9.8)	AFP[例(%)]	
肝炎类型[例(%)]		<400 ng/mL	471(74.6)
不伴病毒感染	14(2.2)	≥400 ng/mL	160(25.4)
HBV感染	517(81.9)	AFP-L3%[例(%)]	
HCV感染	52(8.2)	<10%	387(61.3)
共同感染	48(7.6)	≥10%	244(38.7)
BCLC分期[例(%)]		DCP[例(%)]	
0+A期	545(86.4)	<40 ng/mL	222(35.2)
B期	86(13.6)	≥40 ng/mL	409(64.8)
肿瘤最大径[例(%)]		GP73(ng/mL)	77.2(54.5~115.8)
<5 cm	372(59.0)	Alb(g/L)	38.8(36.1~41.5)
≥5 cm	259(41.0)	TBil(μmol/L)	15.1(11.2~20.7)
肿瘤数量[例(%)]		AST(U/L)	32.3(24.1~48.2)
单发	510(80.8)	ALT(U/L)	31.3(20.8~48.0)
多发	121(19.2)	GGT(U/L)	57.0(33.4~97.3)
肿瘤组织分化[例(%)]		PLT(×10 ⁹ /L)	150.0(108.5~190.0)
高分化	35(5.5)	APRI	0.57(0.37~1.06)
中分化	426(67.5)	FIB-4	2.31(1.55~3.61)
低分化	170(26.9)	GPR	0.69(0.40~1.32)
脉管浸润[例(%)]		S指数	0.26(0.14~0.56)
否	366(58.0)		
是	265(42.0)		

注:HCC,肝细胞癌;Child-Pugh分级,蔡尔德-皮尤分级;HBV,乙型肝炎病毒;HCV,丙型肝炎病毒;BCLC分期,巴塞罗那肝癌临床分期;AFP,甲胎蛋白;AFP-L3%,甲胎蛋白异质体L3百分比;DCP,异常凝血酶原;GP73,高尔基体蛋白73;Alb,白蛋白;TBil,总胆红素;AST,天冬氨酸氨基转移酶;ALT,丙氨酸氨基转移酶;GGT,γ-谷氨酰转移酶;PLT,血小板;APRI,天冬氨酸氨基转移酶/血小板比值指数;FIB-4,纤维化-4指数;GPR,γ-谷氨酰转移酶/血小板比值。



患者的中位生存期均显著短于低表达患者(BCLC 0+A期: $\chi^2=42.14, P<0.001$; BCLC B期: $\chi^2=3.910, P=0.048$);在按照Child-Pugh分级、HBV或HCV感染、肝硬化状态、肿瘤大小、肿瘤组织中低分化、脉管浸润等因素分层的患者中,GP73高表达组的总生存期均低于低表达组(P 值均 <0.05)。在无HBV/HCV感染、HBV/HCV共同感染及肿瘤组织高分化患者中,由于样本量较少,GP73高、低表达组的生存差异均无统计学意义(P 值均 >0.05)。

2.4 预后评估列线图模型的构建及评价 单因素Cox回归结果显示,GP73、性别、Child-Pugh分级、BCLC分期、肿瘤最大径、肿瘤数量、脉管浸润、白蛋白、总胆红素、天冬氨酸氨基转移酶、丙氨酸氨基转移酶、中性粒细胞/淋巴细胞比值、单核细胞/淋巴细胞比值、AFP、AFP-L3%及DCP均与HCC切除术后预后显著相关(P 值均 <0.05);多因素Cox回归分析显示,血清GP73、性别、脉管浸润、总胆红素及肿瘤最大径是HCC切除术后预后的独



注: GP73, 高尔基体蛋白 73; HCC, 肝细胞癌。

图2 不同肝纤维化分期HCC患者的血清GP73水平
Figure 2 Serum GP73 in patients with hepatocellular carcinoma according to Scheuer score



注: a, 显著肝纤维化; b, 肝硬化。GP73, 高尔基体蛋白 73; APRI, 天冬氨酸氨基转移酶/血小板比值指数; FIB-4, 纤维化-4 指数; GPR, γ -谷氨酰转氨酶/血小板比值; ROC 曲线, 受试者操作特征曲线; AUC, 曲线下面积。

图3 GP73、APRI、FIB-4、GPR 及 S 指数对肝纤维化诊断的 ROC 曲线

Figure 3 ROC curves of GP73, APRI, FIB-4, GPR, and S-index for diagnosing liver fibrosis

立影响因素(P 值均 <0.05), 在调整其余 4 个变量后, GP73 高表达仍与术后全因死亡风险独立相关(风险比=2.56, 95%CI: 1.86 ~ 3.52, $P<0.001$)(表 3)。将上述 5 个

表2 不同血清 GP73 表达水平 HCC 患者的临床病理特征
Table 2 Clinicopathological characteristics between HCC patients with low and high serum GP73 levels

变量	GP73 低表达组 (n=235)	GP73 高表达组 (n=396)	χ^2 值	P 值
年龄[例(%)]			0.13	0.714
<60 岁	150(63.8)	247(62.4)		
≥ 60 岁	85(36.2)	149(37.6)		
性别[例(%)]			1.59	0.208
男	191(81.3)	305(77.0)		
女	44(18.7)	91(23.0)		
Child-Pugh 分级[例(%)]			17.43	<0.001
A 级	227(96.6)	342(86.4)		
B 级	8(3.4)	54(13.6)		
肝炎类型[例(%)]			16.99	<0.001
不伴病毒感染	1(0.4)	13(3.3)		
HBV 感染	186(79.1)	331(83.6)		
HCV 感染	31(13.2)	21(5.3)		
共同感染	17(7.2)	31(7.8)		
BCLC 分期[例(%)]			3.71	0.054
0+A 期	211(89.8)	334(84.3)		
B 期	24(10.2)	62(15.7)		
肝硬化[例(%)]			29.22	<0.001
否	112(47.7)	105(26.5)		
是	123(52.3)	291(73.5)		
肿瘤最大径[例(%)]			11.73	<0.001
<5 cm	159(67.7)	213(53.8)		
≥ 5 cm	76(32.3)	183(46.2)		
肿瘤数量[例(%)]			1.12	0.290
单发	195(83.0)	315(79.5)		
多发	40(17.0)	81(20.5)		
肿瘤组织分化[例(%)]			10.69	0.005
高分化	16(6.8)	19(4.8)		
中分化	173(73.6)	253(63.9)		
低分化	46(19.6)	124(31.3)		
脉管浸润[例(%)]			7.76	0.005
否	153(65.1)	213(53.8)		
是	82(34.9)	183(46.2)		
神经浸润[例(%)]			0.631	
否	233(99.1)	394(99.5)		
是	2(0.9)	2(0.5)		

注: GP73, 高尔基体蛋白 73; HCC, 肝细胞癌; Child-Pugh 分级, 蔡尔德-皮尤分级; HBV, 乙型肝炎病毒; HCV, 丙型肝炎病毒; BCLC 分期, 巴塞罗那肝癌临床分期。


变量纳入列线图模型, 各变量根据评分量表赋分, 相加得总分, 用于预测 HCC 患者术后 5 年生存率(图 4)。

列线图模型预测 HCC 患者术后 5 年生存率的 AUC

表 3 HCC 切除术后预后的单因素及多因素 Cox 回归分析
Table 3 Univariate and multivariate Cox analysis of prognosis of HCC resection

变量	单因素分析			多因素分析		
	HR	95%CI	P 值	HR	95%CI	P 值
年龄(≥60 岁 vs <60 岁)	0.99	0.76 ~ 1.30	0.934			
性别(男 vs 女)	1.61	1.13 ~ 2.31	0.009	1.58	1.10 ~ 2.28	0.014
BMI(kg/m ²)	0.95	0.91 ~ 1.00	0.054			
肝炎类型						
HBV 感染 vs 不伴病毒感染	1.09	0.65 ~ 1.81	0.750			
HCV 感染 vs 不伴病毒感染	0.50	0.23 ~ 1.11	0.090			
共同感染 vs 不伴病毒感染	0.98	0.43 ~ 2.25	0.967			
Child-Pugh 分级(B 级 vs A 级)	2.18	1.51 ~ 3.14	<0.001			
BCLC 分期(B 期 vs 0+A 期)	1.70	1.23 ~ 2.34	0.001			
肝硬化(是 vs 否)	1.25	0.95 ~ 1.64	0.118			
肿瘤最大径(cm)	1.12	1.08 ~ 1.16	<0.001	1.07	1.04 ~ 1.11	<0.001
肿瘤数量(多发 vs 单发)	1.57	1.17 ~ 2.11	0.003			
肿瘤组织分化						
中分化 vs 高分化	1.07	0.65 ~ 1.76	0.798			
低分化 vs 高分化	1.60	0.96 ~ 2.67	0.074			
脉管浸润(是 vs 否)	2.09	1.62 ~ 2.70	<0.001	1.69	1.30 ~ 2.21	<0.001
神经浸润(是 vs 否)	1.41	0.35 ~ 5.68	0.630			
Alb(<35 g/L vs ≥35 g/L)	1.50	1.09 ~ 2.07	0.013			
TBil(≥17.1 μmol/L vs <17.1 μmol/L)	1.58	1.23 ~ 2.04	<0.001	1.49	1.16 ~ 1.93	0.002
AST(≥40 U/L vs <40 U/L)	1.91	1.48 ~ 2.46	<0.001			
ALT(≥40 U/L vs <40 U/L)	1.35	1.04 ~ 1.75	0.022			
PLT(≥125 × 10 ⁹ /L vs <125 × 10 ⁹ /L)	1.25	0.96 ~ 1.62	0.094			
PT(≥13 s vs <13 s)	1.16	0.84 ~ 1.58	0.367			
NLR(≥1.90 vs <1.90)	1.64	1.25 ~ 2.14	<0.001			
MLR(≥0.27 vs <0.27)	1.47	1.13 ~ 1.90	0.004			
AFP(≥400 ng/mL vs <400 ng/mL)	1.46	1.11 ~ 1.92	0.007			
AFP-L3%(≥10% vs <10%)	1.44	1.11 ~ 1.86	0.006			
DCP(≥40 ng/mL vs <40 ng/mL)	1.47	1.12 ~ 1.93	0.006			
GP73(≥65 ng/mL vs <65 ng/mL)	2.84	2.08 ~ 3.89	<0.001	2.56	1.86 ~ 3.52	<0.001

注:HCC, 肝细胞癌;HR, 风险比;CI, 置信区间;BMI, 体重指数;HBV, 乙型肝炎病毒;HCV, 丙型肝炎病毒;Child-Pugh 分级, 蔡尔德-皮尤分级;BCLC 分期, 巴塞罗那肝癌临床分期;Alb, 白蛋白;TBil, 总胆红素;AST, 天冬氨酸氨基转移酶;ALT, 丙氨酸氨基转移酶;PLT, 血小板;PT, 凝血酶原时间;NLR, 中性粒细胞/淋巴细胞比值;MLR, 单核细胞/淋巴细胞比值;AFP, 甲胎蛋白;AFP-L3%, 甲胎蛋白异质体 L3 百分比;DCP, 异常凝血酶原;GP73, 高尔基体蛋白 73。




注:GP73, 高尔基体蛋白 73;TBil, 总胆红素。

图 4 列线图模型

Figure 4 Nomogram model

为 0.704(95%CI:0.656 ~ 0.753)(图 5)。校准曲线显示, 预测概率与实际概率基本相符,提示模型具有良好的校准度(图 6)。

为评价在其余 4 个预测变量基础上加入 GP73 能否改善模型性能,将纳入 GP73、性别、脉管浸润、总胆红素和肿瘤最大径的模型定义为含 GP73 模型;此外,在保留性别、脉管浸润、总胆红素和肿瘤最大径 4 个变量的基础上剔除 GP73,构建不含 GP73 模型。在 10 折交叉验证中,含 GP73 模型的平均 C-index 为 0.716(95%CI:0.682 ~ 0.750),显著高于不含 GP73 的模型(C-index=0.682, 95%CI: 0.645 ~ 0.719, P=0.008)及 BCLC 分期系统(C-



注:灰色曲线为10折交叉验证各折时间依赖ROC曲线,橙色曲线为10折平均时间依赖ROC曲线。ROC曲线,受试者操作特征曲线;AUC,曲线下面积。

图5 5年时间依赖ROC曲线

Figure 5 5-year time-dependent ROC curve





图6 列线图模型的5年校准曲线

Figure 6 5-year calibration curve of the nomogram model

index=0.551, 95%CI: 0.523 ~ 0.580, $P < 0.001$ 。

通过综合判别改善指数(integrated discrimination improvement, IDI)与净重分类改善指数(net reclassification improvement, NRI)评估加入GP73后模型整体预测和风险重新分类能力的改善程度。与不含GP73的模型相比,含GP73模型的IDI为0.039(95%CI: 0.016 ~ 0.069, $P < 0.001$), NRI为0.259(95%CI: 0.179 ~ 0.335, $P < 0.001$);与BCLC分期相比,含GP73模型的IDI为0.112(95%CI: 0.069 ~ 0.163, $P < 0.001$), NRI为0.272(95%CI: 0.169 ~ 0.380, $P < 0.001$)。此外,决策曲线分析结果提示,含GP73的列线图模型其临床净获益总体高于不含GP73模型及BCLC分期(图7)。



注:GP73,高尔基体蛋白73;BCLC分期,巴塞罗那肝癌临床分期。

图7 决策曲线分析

Figure 7 Decision curve analysis

3 讨论

本研究结果显示,在可切除HCC患者中,术前血清GP73水平与肝纤维化分期呈显著正相关。既往研究提示,GP73可能通过内质网应激和免疫微环境调控参与胶原沉积及肝窦结构重构,为上述关联提供了生物学解释^[11]。既往关于GP73对肝纤维化诊断价值的研究证据主要来源于慢性肝病或肝硬化人群^[15-16]。本研究以病理分期为标准,进一步补充了GP73在可切除HCC人群中肝纤维化诊断的相关证据。结果显示,GP73诊断显著肝纤维化的效能不劣于APRI、FIB-4等传统复合指标。APRI和FIB-4通过整合转氨酶、血小板、年龄等信息,间接反映肝细胞损伤、门静脉高压相关血液学改变及肝纤维化程度。而GP73是与肝细胞应激、炎症反应及纤维化重塑相关的单一血清标志物,可从不同于传统复合指标的生物学维度提供纤维化相关信息。因此,尽管本研究中GP73诊断显著肝纤维化或肝硬化的AUC未优于APRI/FIB-4,但其仍具备作为补充性血清标志物的潜力,可作为现有无创评估体系的有效辅助指标。

GP73不仅与肝纤维化程度相关,也可与可切除HCC患者的术后生存风险相关。既往研究提示,GP73可通过调控信号转导与转录激活因子3信号通路、影响免疫检查点分子表达及重塑肿瘤微环境,促进肿瘤细胞增殖、侵袭与免疫逃逸,从而导致不良预后^[17]。一项Meta分析结果亦显示,GP73升高与HCC患者较差预后相关^[18]。本研究中,术前高GP73水平患者总生存期较短;多因素Cox回归分析中,在调整性别、脉管浸润、总胆红素和肿瘤最大径后,GP73高表达仍与术后全因死亡风

险独立相关,提示其具有超越常规临床病理因素的补充预后价值。在此基础上,本研究构建了纳入GP73的列线图模型。与仅基于传统指标、不含GP73的模型相比,纳入GP73后模型的预测效能显著提升。这表明,GP73不仅是有效的预后标志物,而且在现有临床信息基础上具备明确的增量预测价值,有助于提升术前个体化预后评估的准确性。

相较于BCLC分期等传统分期系统,本研究构建的列线图模型在可切除HCC患者中展现出更高的区分度与更强的个体化预测能力。BCLC分期更适合从整体层面指导治疗策略选择,而对同一分期内患者的预后差异,其解释能力较为有限;此外,该分期系统未将肝纤维化程度及相关生物学标志物纳入考量,故难以充分反映肿瘤生长微环境和残余肝功能储备的异质性^[19]。本研究结果提示,在术前常规临床评估基础上联合检测GP73,有望弥补这一不足,实现更精细的个体化风险评估。

本研究基于GP73构建的列线图模型具有明确的临床指导意义。该模型中GP73检测方法简便易行,列线图形式直观清晰,便于在临床实践中推广应用,尤其适用于对同一BCLC分期内的患者进行风险再分层^[20]。首先,在手术风险评估与术式选择方面,术前高GP73水平提示患者肝脏基础状况较差,术后发生肝功能不全的风险相对更高。对于此类患者,外科医生在规划手术时需设定更严格的残肝体积标准,以降低术后严重并发症的风险。其次,在术后随访策略方面,该模型有助于实现分层管理。对于列线图评分较高的高危患者,应制定更为密切的随访计划,以便早期发现并及时处理潜在的肿瘤复发,进而改善患者的总生存期。基于GP73的风险分层有助于优化围手术期管理,在兼顾肿瘤根治性的同时,降低术后不良结局的发生风险。

本研究的优势在于样本量相对较大,且研究对象聚焦于可切除HCC人群。然而,本研究仍存在一定局限性。首先,作为单中心回顾性研究,可能存在选择偏倚,模型的普适性有待通过前瞻性、多中心的外部验证加以确认。其次,GP73的最佳截断值采用X-tile软件基于本队列数据确定,可能存在过拟合风险。此外,本研究以总生存期作为研究终点,后续研究可纳入复发与肝功能失代偿等临床终点。未来研究应聚焦于多中心、前瞻性设计,进一步深入探索GP73在肝癌发生发展中的分子机制,并结合病因学背景、分子分型及影像组学等信息,构建多模态整合模型,以进一步提升预测性能。

综上所述,血清GP73在可切除HCC患者中兼具肝纤维化无创评估与术后生存预测的双重临床价值。基于GP73构建的预后评估模型有助于提升术前风险分层的精准度,从而优化个体化治疗策略及术后随访方案。

伦理学声明: 本研究方案于2022年5月31日经吉林大学第一医院伦理委员会审批,批号:2022-HS-018,所有患者均签署知情同意书。

利益冲突声明: 本文不存在任何利益冲突。

作者贡献声明: 霍婉莹负责研究设计,分析数据,撰写论文;何华负责研究设计,修改论文;于馨一、贺迈漫负责资料收集,数据汇总;姜晶负责拟定写作思路,指导撰写文章并最后定稿。

参考文献:

- [1] Bray F, Laversanne M, Sung H, et al. Global cancer statistics 2022: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries[J]. CA Cancer J Clin, 2024, 74(3): 229-263. DOI: 10.3322/caac.21834.
- [2] Wang Z X, Qin H J, Liu S, et al. Precision diagnosis of hepatocellular carcinoma[J]. Chin Med J, 2023, 136(10): 1155-1165. DOI: 10.1097/CM9.0000000000002641.
- [3] Yao L Q, Fan H X, Chen F J, et al. Heterogeneity in prognosis for early-stage hepatocellular carcinoma after hepatectomy: A multicenter analysis of 4, 623 patients across five major staging systems[J]. Eur J Surg Oncol, 2025, 51(10): 110383. DOI: 10.1016/j.ejso.2025.110383.
- [4] Sonohara F, Yamada S, Tanaka N, et al. Comparison of non-invasive liver reserve and fibrosis models: Implications for surgery and prognosis for hepatocellular carcinoma[J]. Hepatol Res, 2019, 49(11): 1305-1315. DOI: 10.1111/hepr.13400.
- [5] Zhang J W, Zhang L, Yang X B, et al. Liver fibrosis as a predictor of liver failure and outcome following ALPPS among patients with primary liver cancer[J]. Sci Rep, 2024, 14: 15827. DOI: 10.1038/s41598-024-65924-2.
- [6] Loomba R, Adams L A. Advances in non-invasive assessment of hepatic fibrosis[J]. Gut, 2020, 69(7): 1343-1352. DOI: 10.1136/gutjnl-2018-317593.
- [7] Smith A, Baumgartner K, Bositis C. Cirrhosis: Diagnosis and management[J]. Am Fam Physician, 2019, 100(12): 759-770.
- [8] Lan B, Luo C, Pocha C, et al. Comparison of various liver cancer staging systems in predicting prognosis after initial transcatheter arterial chemoembolization: A retrospective study from China[J]. J Gastrointest Oncol, 2024, 15(6): 2599-2612. DOI: 10.21037/jgo-2024-850.
- [9] Ke M Y, Wu X N, Zhang Y, et al. Serum GP73 predicts posthepatectomy outcomes in patients with hepatocellular carcinoma[J]. J Transl Med, 2019, 17(1): 140. DOI: 10.1186/s12967-019-1889-0.
- [10] Wang Q, Cui H X, Zhu Y P, et al. Serum Golgi protein 73 (GP73) is a diagnostic and prognostic marker of hepatocellular carcinoma[J]. Front Med, 2025, 12: 1571761. DOI: 10.3389/fmed.2025.1571761.
- [11] Feng P P, Hu X Y, Zhou S N, et al. Golgi protein 73: The driver of inflammation in the immune and tumor microenvironment[J]. Front Immunol, 2024, 15: 1508034. DOI: 10.3389/fimmu.2024.1508034.
- [12] 安薪宇, 乔杰, 胡灵溪, 等. GP73对慢性肝病患者肝纤维化诊断价值的研究[J]. 中华内科杂志, 2023, 62(1): 49-53. DOI: 10.3760/cma.j.cn112138-20220514-00371.

- An Xinyu, Qiao Jie, Hu Lingxi, et al. A study on the diagnostic value of GP73 in liver fibrosis among patients with chronic liver disease [J]. Chin J Intern Med, 2023, 62(1): 49-53. DOI: 10.3760/cma.j.cn112138-20220514-00371.
- [13] 中国中西医结合学会肝病专业委员会. 肝纤维化中西医结合诊疗指南(2019年版)[J]. 临床肝胆病杂志, 2019, 35(7): 1444-1449. DOI: 10.3969/j.issn.1001-5256.2019.07.007.
- Liver Disease Committee, Chinese Association of Integrative Medicine. Guidelines for the diagnosis and treatment of liver fibrosis in integrative medicine practice (2019) [J]. J Clin Hepatol, 2019, 35(7): 1444-1449. DOI: 10.3969/j.issn.1001-5256.2019.07.007.
- [14] Borcak D, Yesilbag Z, Ozdemir Y E, et al. Assessing liver fibrosis in chronic hepatitis B: Liver biopsy or non-invasive fibrosis markers? [J]. J Clin Med, 2025, 14(22): 8164. DOI: 10.3390/jcm14228164.
- [15] 范海纳, 马杨青, 孙鑫, 等. 血清高尔基体蛋白 73 对乙型肝炎肝纤维化病理预后的评估作用及其炎症影响因素[J]. 中华肝脏病杂志, 2025, 33(8): 772-780. DOI: 10.3760/cma.j.cn501113-20240419-00212.
- Fan Haina, Ma Yangqing, Sun Xin, et al. Role of serum Golgi protein 73 in the assessment of pathological prognosis and its inflammatory influencing factors for hepatitis B virus-related liver fibrosis [J]. Chin J Hepatol, 2025, 33(8): 772-780. DOI: 10.3760/cma.j.cn501113-20240419-00212.
- [16] Ye J Z, Gao X, Huang X, et al. Integrating single-cell and spatial transcriptomics to uncover and elucidate GP73-mediated pro-angiogenic regulatory networks in hepatocellular carcinoma [J]. Research (Wash D C), 2024, 7: 0387. DOI: 10.34133/research.0387.
- [17] Liu Y M, Hu X Y, Zhou S N, et al. Golgi protein 73 promotes angiogenesis in hepatocellular carcinoma [J]. Research (Wash D C), 2024, 7: 0425. DOI: 10.34133/research.0425.
- [18] Zhang J, Zhang M K, Ma H M, et al. A meta-analysis of the prognostic significance of Golgi protein 73 in hepatocellular carcinoma in Chinese patients [J]. Arch Med Sci, 2020, 16(5): 1104-1110. DOI: 10.5114/aoms.2019.83821.
- [19] Chen L J, Chang Y J, Chang Y J. Survival predictability between the American joint committee on cancer 8th edition staging system and the Barcelona clinic liver cancer classification in patients with hepatocellular carcinoma [J]. Oncologist, 2021, 26(3): e445-e453. DOI: 10.1002/onco.13535.
- [20] 任滕, 杨益, 李紫明, 等. 850 例单中心肝细胞癌患者的临床特征与预后分析 [J]. 临床肝胆病杂志, 2024, 40(10): 2019-2026. DOI: 10.12449/JCH241015.
- Ren Meng, Yang Yi, Li Ziming, et al. Clinical features and prognosis of hepatocellular carcinoma: A single-center study of 850 cases [J]. J Clin Hepatol, 2024, 40(10): 2019-2026. DOI: 10.12449/JCH241015.

收稿日期: 2026-03-17; 录用日期: 2026-04-10

本文编辑: 葛俊

引证本文: 霍婉莹, 何华, 于馨一, 等. 高尔基体蛋白 73 对可切除肝细胞癌患者肝纤维化程度及预后的评估价值 [J]. 临床肝胆病杂志, 2026, 42(8): 1878-1887.

Huo Wanying, He Hua, Yu Xinyi, et al. Value of Golgi protein 73 in assessing liver fibrosis degree and prognosis of patients with resectable hepatocellular carcinoma [J]. J Clin Hepatol, 2026, 42(8): 1878-1887.

· 国外期刊精品文章简介 ·

***Gut* | A20 介导 KEAP1 泛素化调控肝细胞铁死亡改善自身免疫性肝炎**

既往研究发现, A20(一种泛素编辑酶)的有害变异与自身免疫性肝炎(AIH)相关,但其在 AIH 发病中的具体作用与机制尚不明确。2026 年 7 月,华中科技大学同济医学院附属同济医院 Chen 等在 *Gut* 发表研究,首次揭示肝细胞 A20 通过抑制铁死亡保护 AIH,阐明 A20-KEAP1-NRF2 轴新机制。研究通过临床样本、肝细胞特异性 A20 敲除/过表达小鼠模型、蛋白质组学、免疫共沉淀及定点突变等技术,系统解析了 A20 的作用与机制。结果显示, AIH 中 A20 表达下调,且与炎症指标呈负相关; A20 缺失加重肝损伤、纤维化及铁死亡,过表达则相反。机制上, A20 经 C 端锌指结构介导 KEAP1 K108 位 K48 泛素化降解,激活 NRF2 抗氧化通路,抑制铁死亡; K108R 突变可逆转此效应。AdipoRon 诱导 A20 可减轻肝损伤及铁死亡。临床样本证实 A20 与 NRF2/GPX4 呈正相关,与 KEAP1 呈负相关。

此研究的核心贡献主要体现在 3 个方面。第一,首次阐明肝细胞 A20 在 AIH 中的保护作用,将 A20 从传统的炎症负调控因子拓展至铁死亡调控领域,揭示了“泛素化修饰-抗氧化通路-铁死亡”这一新的肝损伤调控轴。第二,精确鉴定 KEAP1 蛋白 K108 位点为 A20 介导泛素化降解的关键位点,为靶向干预提供了明确的分子靶点。第三,提供了 AdipoRon 作为 A20 诱导剂在 AIH 中“老药新用”的概念验证,为 AIH 治疗提供了一种具有临床转化潜力的新策略。

该研究最重要的意义在于揭示了 A20-KEAP1-NRF2 轴在 AIH 肝细胞铁死亡中的核心调控作用,为 AIH 治疗从泛免疫抑制走向靶向分子干预提供了明确的理论基础与潜在药物候选。未来仍需在 A20 基因变异人群、不同 AIH 模型及临床队列中进一步验证该通路的因果关系,并通过严格临床试验评估 A20 靶向策略在 AIH 患者中的安全性、有效性和最佳干预时机。

摘译自 Chen Y, Li W, Wang S, et al. A20-mediated KEAP1 ubiquitination orchestrates hepatocyte ferroptosis to ameliorate autoimmune hepatitis [J]. *Gut*, 2026, 75(8): 1573-1586. DOI: 10.1136/gutjnl-2025-336363.

(吉林大学第一医院感染病中心肝病科 宋岩 金清龙 报道)