雄风称霸王





撰文 王祖望 冯祚建 江英 《兽谱》故画供图 故宫出版社 动物摄影 乔轶伦

瑞兽

在《兽谱》中，瑞兽竟然占了近六成的比例，如此众多具有传奇色彩的瑞兽，图文并茂地集中在一部图志中，它所蕴藏的深厚的历史、政治、宗教、美学和科技等内涵，值得读者进一步挖掘与探讨。譬如中国历代统治者，往往要借助于一些超自然力量的“瑞兽”的出现，来标榜统治者施行“仁政”，并向世人证明其国家的强盛。孔子为代表的儒家，崇尚“五德”（仁、义、礼、智、信），并以此来规劝统治者“顺天意、施仁政”，继而就会出现了“风调雨顺，社会安定昌盛”的祥和局面，“于是就会有奇异珍兽出现，来显示祥瑞”。《兽谱》的作者们，正是在这样的思想指导下，创造出诸多以“五德”为核心价值观，人性化的瑞兽、义兽、仁兽的可爱形象。







画名：麒麟

古名：麒麟




麒麟

麒麟仁獸麤身牛尾馬蹄一角角端有肉稟木精而資土氣故其色青黃牡曰麒牝曰麟含仁懷義音中律呂動有威儀孝經援神契云德至鳥獸則麒麟臻蓋太平之符仁厚之徵也是以言四靈者麟為之首粵稽唐虞近在郊埜而周南之化風人亦取興焉

麒麟是中国家喻户晓的传说神话动物。作为人们心目中的灵物，麒麟含仁怀义、品行高洁，它的出现被认为是昭示吉祥幸福的瑞兆。人们甚至将麒麟与圣君明主联系起来，认为只有天下太平、国泰民安，才会有麒麟出现。

麒麟还是生活中常见的装饰纹样，如房屋前的麒麟石像、窗上的麒麟剪纸、幼儿佩戴的麒麟锁等，都是因为人们认为麒麟有驱邪的神性。

3封面故事.indd 5 2014.3.31 11:04:25 PM

画名：白泽
古名：白泽





白泽是传说中昆仑山上著名的神兽，浑身雪白，能说人话，通万物之情，平时很少出没，常与麒麟等一同被视为德行高的统治者治世的象征，是可使人逢凶化吉的吉祥之兽。传说记载白泽所述精怪的《白泽图》在后世广为流传。

白泽除了被视为国家祥瑞的象征外，还成为辟邪的图案出现在旗帜、枕头和服饰等处。

3封面故事.indd 6 2014.3.31 11:04:26 PM

画名：骆虞

古名：骆虞





骆虞是传说中的仁兽，《毛诗注疏》称：“骆虞义兽也，白虎黑文不食生物，有至信之德则至。”有趣的是，明代曾三次报告瑞兽骆虞出现，并将相关个体公开展示，借此宣告由“天意”促成的崭新“纪元”的开始。

《兽谱》中的骆虞由画家根据古籍的形态描述创造得出，其外形和毛色与雪豹稍似，但雪豹身体大部具不规则圆环，而非斑点或条斑。

3封面故事.indd 7 2014.3.31 11:04:28 PM

画名：果然

古名：果然，猓然



古人将果然（猓然）视作仁兽，认为它虽然是禽兽，却有人类的善良之心。对此，明李时珍在《本草纲目》中有一段形象的描述：“喜群行，老者前，少者后，食相让，居相爱，生相聚，死相赴。柳子所谓仁让孝慈者是也。”



画名：獬豸

古名：神羊，任法兽

獬豸是中国古书中常见的一种神兽。相传它能辨曲直，当人们发生冲突或纠纷的时候，獬豸能用角指向无理的一方，甚至会将罪该万死的人用角抵死，令犯法者不寒而栗。所以獬豸也是执法公正的化身，古代法官戴的帽子又称“獬豸冠”。

3封面故事.indd 8 2014.3.31 11:04:29 PM

画名：独角兽

古名：独角兽





独角兽是在中西方流传很广的一类神话动物，象征正义、公平、纯洁、诚实和吉祥如意。但中西方对独角兽的形象刻画截然不同。

《兽谱》描绘的这幅独角兽产自印度，是在众多瑞兽中，唯一来自异国的瑞兽，由画家根据清南怀仁所撰《坤舆图说》中的文字说明创作而成。

3封面故事.indd 9 2014.3.31 11:04:30 PM







现实存在兽

据统计，《兽谱》记载的国产现实存在兽类共61种，约占《兽谱》记载物种总数的34%。所谓现实存在兽种，是指《兽谱》的文字说明或图形基本能反映该兽的主要形态特征及生活习性；其中有部分物种，文字说明基本正确，虽图像有夸张之成分，但仍可以依据文字或图形来鉴别其所属的分类阶元，并给出今名及相应的拉丁学名。但在《兽谱》的现实存在兽类中，还存在一些兽种的文字说明或图形的想象成分大于现实成分，这给我们的考证工作带来巨大的困难。遇到此类情况，大家本着实事求是的科学态度，只给出粗略的分类阶元，涉及某些物种的鉴别，或留待后人做进一步的考证。






3封面故事.indd 10 2014.3.31 11:04:35 PM

画名：虎

古名：虎甘，虎，黱，李父，李耳，大虫

今名：虎

Panthera tigris


虎

虎為獸長為山君春秋文曜鉤曰虎七月而生陽立於七故首尾長七尺立秋始嘯仲冬始交交則月暈嘯則風生王充所謂氣至而類動者也五指者為貙淺毛者為豽貓白者為虓黑者為黱惟黃質黑章者無異名李父李耳於菟伯都則皆方言耳





虎隶属哺乳类、食肉目、猫科，是一种大型食肉动物，体重130~230公斤，体长1.4~2.8米，被人们称为森林之王，处于自然生态系统食物链的高端。虎分布的范围极广，从西伯利亚针叶林到开阔的草地再到热带沼泽都有。它们的领地观念十分强烈，通常需要大面积的栖息地，以满足相当数量的猎物。虎曾在亚洲各地广泛分布，在我国除青藏高原外，各地都有过分布，在我国曾有5个亚种，但由于人类猎捕以及生产活动造成它们的栖息地丧失，导致虎的数量急剧下降，成为高度濒危物种。虎已被列为国家Ⅰ级重点保护野生动物，CITES列为附录－Ⅰ物种。

3封面故事.indd 11 2014.3.31 11:04:37 PM

画名：豹

古名：豹

今名：豹，金钱豹

Panthera cf. pardus




豹

豹廉獸也形小於虎斑如錢而黑比比相次文采蔚然故列女傳謂南山隱霧之豹欲以澤其毛衣而成文章古者或以樹侯或以為裘為冠為鴈及屬車之飾皆昭其文也



豹是食肉目猫科动物，体矫健，上体棕黄色，遍布黑褐色空心的金钱斑，故称金钱豹或花豹。豹广泛产于亚洲和非洲，在我国太行山、秦岭、长白山、武夷山等地均有分布。豹主要栖息于山地、丘陵、树林中，营独居夜行生活。其性情机敏，动作灵活，既能游泳，又会爬树，嗅觉、听觉、视觉都很好，善于跳跃和攀爬，可以说是完美的猎手。猿猴、野兔、野鹿和鸟类等都是豹的猎食对象。由于其栖息地的丧失和猎杀，数量急剧下降，已成为我国高度濒危物种，被列入国家Ⅰ级重点保护野生动物，CITES列为附录－Ⅰ物种。

3封面故事.indd 12 2014.3.31 11:04:39 PM

画名：羆

古名：羆

今名：棕熊，马熊

Ursus arctos


羆

羆有二種其黃白而人形者即詩所謂黃羆猶赤豹之別於豹也此則全與熊類黑而微黃大者重千餘斤跮伏窩集間上東巡至吉林壹發殪之貂聖武焉按北山經云倫山有獸曰羆文與燕山碣石相次以道里計之當其地矣惟經言狀如麋圖因之而誤洵夫志怪難徵百聞固不如一見乎





棕熊属于食肉目、熊科，是食肉目中体型最大的动物之一，体重125~225公斤，体长1.2~1.8米。棕熊分布于欧亚大陆以及北美洲大陆的大部分地区，在我国分布于东北、内蒙古、甘、新、青、藏、川、滇等地。主要栖息在针叶林或针阔混交林中，在青藏高原可生活在海拔4 500~5 000米的高山草甸地带。性情凶猛，雌雄均单独活动，有冬眠习性，多在白天活动，行走缓慢，没有固定的栖息场所。食性较杂，植物包括各种根茎、块茎、草料、谷物及果实等，动物包括蚂蚁、蚁卵、昆虫、啮齿类、有蹄类、鱼和腐肉等，喜食蜜。由于长期过量捕猎和栖息地缩小，野生数量很少，华北地区几乎绝迹。现列为国家Ⅱ级重点保护野生动物，CITES列为附录－Ⅰ物种。

3封面故事.indd 13 2014.3.31 11:04:42 PM

画名：熊

古名：熊

今名：黑熊，黑瞎子

Ursus thibetanus




熊

熊豕形而人足目上竪色黑冬蟄春出蟄則自舐其掌善
緣木引氣是為熊經其行雖踰千里恚有跲伏之所在山
巖枯木中山民謂之熊館性堅中強毅多力故取其義熊
旂五斿以象伐大射共熊侯田獵設熊席以莅衆乘輿之
行前有旌頭旌頭者熊皮冠也執罕者冠之



黑熊属于食肉目、熊科，通体黑色，胸斑白色，体重150~250公斤，体长1.5~1.9米。黑熊身体粗壮，栖息于亚热带至亚寒带的热带雨林、季风常绿阔叶林、针阔混交林或高山稀树灌丛地带。主要在白天活动，善爬树、游泳，能直立行走。黑熊在南方终年活动，在北方有冬眠习性。视觉差，嗅觉、听觉灵敏。食性较杂，以植物叶、芽、果实、种子为食，有时也吃昆虫、鸟卵和小型兽类。在我国分布于东北、冀、豫、陕、甘、藏、川、滇、黔、渝、桂、粤、琼、鄂、湘、赣、闽、台、浙、皖等地。由于过度捕猎，野生黑熊数量明显下降，已列入国家Ⅱ级重点保护野生动物，CITES列为附录－Ⅰ物种。

3封面故事.indd 14 2014.3.31 11:04:45 PM

画名：象

古名：象，伽那，伽耶，那先，大客

今名：亚洲象

Elephas maximus


象

象產滇粵日南及西域諸國有蒼白二色白者惟拂菻大食有之肉無十牛目纔若豕四足如柱無趾而有爪甲長鼻下垂能卷舒致用牙出兩吻間雄者長六七尺蛻牙則自埋藏之性久識能浮水又能別道之虛實故導車用焉說者謂其合於天象蓋瑤光之精也





亚洲象属于长鼻目、象科，其体小于非洲象，是南亚和东南亚特有种，为亚洲大陆现存最大的动物。它们在历史上分布很广，从西亚的两河流域到中国的黄河流域都有其踪迹，但如今就集中在南亚和东南亚热带地区，中国境内仅分布于云南西双版纳自然保护区的小勐养、尚勇、勐腊等地。亚洲象喜欢人烟稀少、温暖湿润的森林、沼泽地区，不适应环境的剧烈变化；喜群居，每群数头、数十头不等，在林中游走后常形成明显的象路。主食竹笋、嫩叶、野芭蕉和棕叶芦等，性情温和，较易驯服。列为国家Ⅰ级重点保护野生动物，CITES列为附录－Ⅰ物种。

3封面故事.indd 15 2014.3.31 11:04:47 PM

画名：狼

古名：狼或狼（牡），
豲（牝），獀（子）

今名：狼，灰狼

Canis lupus




狼

狼大如狗銳頭駢脅高前廣後色黃黑雜亦有蒼白者性
貪行善顧能作兒啼聲以誘人埤雅謂其靈智將逐食必
先倒立以卜所向今獵師遇狼輒喜管子所云舉狼章則
山行或以是皺皮可為裘故獸人冬獻狼



狼属于食肉目、犬科，为现生犬科动物中体型最大的物种。体重23~30公斤，体长1.0~1.4米。狼曾经是地球上分布地区最广的哺乳动物，但如今在西欧、墨西哥与美国大部份地区已绝迹，目前主要分布在亚洲、欧洲、北美和中东。在我国除台湾、海南外，全国均有分布。适应性较强，在山地、丘陵、森林、草原、荒漠、冻原均有其踪迹。狼独栖或成对同栖，北方的狼多在冬季集群，每群不超过20只。狼历来被认为是农、牧业的害兽而被捕杀，致使数量急剧下降。现列为CITES附录－Ⅱ级物种。

3封面故事.indd 16 2014.3.31 11:04:49 PM

画名：孟极

古名：孟极

今名：雪豹

Uncia uncia







孟极，传说中的兽名。《山海经•北山经卷》曰：“兽，其状如豹，而文题白身，名曰孟极，是善伏，其鸣自呼。”

雪豹属于食肉目、猫科，为高寒种类，栖于海拔2 500~5 000米高山上，常见于雪线附近的裸岩区。其体背浅灰色，周身有黑色环斑。一般体重30～50公斤，体长1～1.3米。雪豹敏感，机警，昼伏夜出，以各种啮齿类、野兔和中型食草动物为食。其巢穴多设在高山岩洞中，多成对同居，其一般发情期在冬末1～3月，于4～6月产仔。在我国分布于青藏高原、新疆、甘肃及云南等地。为濒危种，被列为国家Ⅰ级重点保护野生动物，CITES列为附录－Ⅰ物种。

3封面故事.indd 17 2014.3.31 11:04:51 PM

画名：狐

古名：狐

今名：赤狐，红狐，狐狸

Vulpes vulpes




狐

狐亦似犬南北皆有之而北方尤多性善疑審聽故河氷
始合時視有狐跡乃可涉昔人謂狐有三德而以其色中
和為稱首則黃乃狐之常色小雅云狐裘黃黃玉藻云狐
裘黃衣以裼之蓋古者為裘惟黃色一種耳今則白狐世
恒有之不必泥狐白集腋之說也



赤狐属于食肉目、犬科，通常体背红棕色或棕黄色，尾形粗圆，尾毛长而蓬松，有尾下腺，可释放狐臭。体重3.8~6.5公斤，体长0.58～0.95米。全身白化者为个体变异，能遗传。广泛分布于欧亚大陆和北美大陆，还被引入到澳大利亚等地。在我国除台湾、海南外，全国各地均有分布。赤狐栖息于森林、灌丛、草原、荒漠、丘陵、山地等多种环境中，动作敏捷，性情多疑。喜欢居住在土穴、树洞或岩石缝中，有时也占据兔、獾等动物的巢穴，通常昼伏夜出，以啮齿类等为食，是鼠类的主要天敌。此外赤狐也吃蛙、鱼、雉类、昆虫及浆果。它的腿脚虽然较短，爪子却很锐利，奔跑迅速，善于游泳和爬树。由于过度捕猎和利用，数量明显下降，成为易危种。

3封面故事.indd 18 2014.3.31 11:04:54 PM

画名：麋

古名：麋

今名：麋鹿，四不像

Elaphurus davidianus


麋

麋陰獸似鹿而色青黑陽生則陰退故角解於仲冬性與鹿異鹿善警麋善迷鹿跡速麋跡遲鹿處山林麋愛水澤多牝少牡千百為羣嚙食草根其地成泥謂之麋腹藝稻者或資之周官大夫射麋侯獸人夏獻麋則祛迷惑而除害稼者也





麋鹿属于偶蹄目、鹿科，因为它头脸像马、角像鹿、颈像骆驼、尾像驴，故又名“四不像”，为中国特有种。体重147.9～214.5公斤，体长1.8～2.2米。喜在气候温暖的平原、沼泽和水域附近活动。据历史记载，麋鹿曾分布于我国辽宁、华北、长江中下游地区，约在汉朝末年就近乎绝种，元朝时，残余的麋鹿被捕捉运到皇家猎苑内饲养。到清朝时，只有北京南海子皇家猎苑内还有一群，1900年随着南海子猎苑的毁坏而在中国消失，直到1980年从国外重新引回80只放养，目前已繁殖到2000头，现在已扩散放养到全国11个省（区、直辖市），以江苏大丰、北京南苑、湖北石首、河南原阳、浙江临安为多。现列为国家Ⅰ级重点保护野生动物。

3封面故事.indd 19 2014.3.31 11:04:57 PM

画名：鹿

古名：鹿

今名：梅花鹿

Cervus nippon




鹿

鹿陽獸也壽千歲黃質白斑昔人因有斑龍之稱壯者大而有角枝觡長短皆應律解以夏至陽感陰而退也性好羣而相比食則相呼居則環角外嚮以相衛故麗皮為禮者尚之而小雅鹿鳴亦以為燕饗嘉賓之喻焉



梅花鹿属于偶蹄目、鹿科。因体背有鲜明的白色斑点成行排列而得名，也叫花鹿。眼大,眶下腺明显,呈裂缝状。体重81～155公斤，体长1.42～1.70米。喜栖息于针阔混交林的林间、山地草原和森林边缘草地，一般不进入密林。主要以青草、嫩芽、嫩树枝叶、沙参等为食。每年8～11月交配,怀孕期7～8个月，4～6月为产仔盛期，每胎1～2仔。现今野生梅花鹿数量非常稀少，在我国已处于高度濒危或极危状态，被列为国家Ⅰ级重点保护野生动物。

3封面故事.indd 20 2014.3.31 11:04:58 PM

画名：麂

古名：麂，麋

今名：赤麂，麂，黄猄（黄麋）

Muntiacus muntjak


麂

麂古字作麏似麇而小黧色豹脚脚短而力劲好鬬善跳越行草莽中但循一径其聲几几然皮柔韧宜履鳥山林多有之不必女几之山也





麂属于偶蹄目、鹿科。成体体重16～25千克，体长75～115厘米。腿细而有力，善于跳跃，皮很软可以制革。通称“麂子”。中国分布有三种，分别是黑麂、赤麂和小麂，其中以黑麂数量最少。栖息于密林、草丛、山地丘陵，有时也进入居民点和农田周围。善于单独生活。性机警，以种子、嫩草、树枝等为食。春季交配，妊娠期半年左右，每胎产1～2仔。

3封面故事.indd 21 2014.3.31 11:05:01 PM

画名：骆驼

古名：驼，骆驼

今名：骆驼，双峰驼

Camelus bactrianus



骆驼属于偶蹄目、骆驼科。头较小，体高大，颈粗而长，弯曲如鹅颈。躯体高大，体毛褐色。四肢细长，蹄大如盘，两趾、跖有厚皮。其背上有2个驼峰，可存脂肪。骆驼胃有三室，能大量贮存水。骆驼可以在没有水的条件下生存2周，没有食物可生存一个月之久。栖息在干旱地区，以梭梭、胡杨、沙拐枣等各种荒漠植物为食。寿命35～40年。繁殖期4～5月，孕期12～14个月，每胎1仔。在我国主要分布于新疆、内蒙古、甘肃、青海等地。高度濒危，被列为国家Ⅰ级重点保护野生动物。



3封面故事.indd 22 2014.3.31 11:05:03 PM

画名：麝

古名：麝，麝父

今名：麝，香麅，獐子

Moschus spp.


麝

麝一作獝亦曰麝父似麈而小黑色喜食柏葉臍有香遠射養生論所謂麝食柏而香也或云夏食蟲蛇寒即香滿至春則自剔出覆其穢溺中皆有常處人往往以是蹤跡之若逐之急即自投高巖爪抉其臍雖就縶不可得豈愛其香甚於愛其身耶





麝属于偶蹄目、麝科。雄性大于雌性，两性均无角。一般体重7～13公斤，体长0.7～0.9米。麝的前肢短，后肢长，蹄小耳大，雄性有发达獠牙。体呈棕色，背部较深；有的呈灰褐色，有的有不甚明显的土黄色条纹和斑点。麝属中有5个种，包括原麝、林麝、马麝、黑麝与喜马拉雅麝。雄麝腺囊中的分泌物干燥后形成麝香，是一种十分名贵的药材和香料。多栖息于针叶林、针阔叶湿交林、疏林灌丛地带的悬崖峭壁和岩石山地。每年12月至翌年1月发情交配，夏初产仔，每胎1～2仔。在我国分布于内蒙古、东北、华北及陕西南部等地区。由于过度捕猎和利用，数量急剧下降，已列为国家Ⅰ级重点保护野生动物，CITES列为附录-Ⅱ物种。

3封面故事.indd 23 2014.3.31 11:05:04 PM

画名：貆

古名：貆，狗獾

今名：狗獾

Meles meles

或 *M.Leucurus*





貆

貆俗名狗獾魏風伐檀所歌懸貆者也與貛貉皆生山野中穴土而居食瓜果形似狗而小肥澤過之尖喙短足深毛褐色皮亦可為裘弗貴也



狗獾属于食肉目、鼬科。头扁，鼻尖，耳短，颈短粗，尾巴较短，四肢短而粗壮，爪有力适于掘土，经常在洞里生活。通常獾的毛色为灰色，下腹部为黑色，脸部有黑白相间的条纹。食性很杂，主要吃植物根茎果实、蚯蚓，但也吃昆虫和小型哺乳动物。狗獾多栖息在森林、山地灌丛、荒山、沙丘草地和湖泊河流两岸。穴居，夜行性，善挖洞，具半冬眠习性。1～2岁性成熟，妊娠期230天左右，每胎产仔2～5只。

3封面故事.indd 24 2014.3.31 11:05:07 PM

画名：貉

古名：貉

今名：貉

Nyctereutes procyonoides


貉

貉生山野間狀如貍毛黃褐色黑文斑然性嗜睡營窟深曲以避雨暘與獾同穴而各處雖出必以貉為導故將獵而祭表貉謂表其先導則知獸所聚而取之幽風一之日于貉取彼狐貍是也傳言貉不踰汶而王浚川謂北曰狐南曰貉果何據哉





貉属于食肉目、犬科。中等体型，外形似狐，但较肥胖。体重3.1～8.2公斤，体长0.45～0.69米。吻尖，耳短圆，面颊生有长毛。四肢和尾较短，尾毛长而蓬松。貉的毛色因地区和季节不同而有差异。貉生境颇广，平原、丘陵、河谷、溪流附近均有栖息，穴居。杂食性，主要以鱼、虾、蛇、蟹、小型啮齿类、鸟类及鸟卵等为食，也吃植物性食物如浆果、真菌、谷物等。每年3月间交配，一雄配多雌，5～6月间产仔，每胎4～8只，多者有10多只。在我国分布很广，为经济毛皮兽，貉毛是制笔原料。

3封面故事.indd 25 2014.3.31 11:05:08 PM

画名：蜼

古名：蜼

今名：金丝猴，仰鼻猴

Rhinopithecus sp.





金丝猴属于灵长目、猴科。鼻孔上仰或显著上仰。我国金丝猴分川金丝猴、黔金丝猴、滇金丝猴和2012年发现的“怒江金丝猴”。金丝猴为树栖动物，常年栖息于海拔1 500～4 000米的针阔叶混交林或高寒冷杉暗针叶林带。主食有树叶、嫩树枝、花、果，也吃树皮和树根。金丝猴具有典型的家族式群居生活方式，成员之间相互关照，一起觅食，一起玩耍休息。全年均有交配，但8～10三个月为交配盛期，孕期6个月左右，多于3～4月产仔。金丝猴属濒危种，已被列为国家Ⅰ级重点保护野生动物，CITES列为附录-Ⅰ物种。

3封面故事.indd 26 2014.3.31 11:05:09 PM

画名：玃

古名：玃，玃父，马化

今名：猕猴（？）

Macaca sp.



玃为古代猿猴类动物名。晋干宝 《搜神记》卷十二：“蜀中西南高山之上，有物与猴相类，长七尺，能作人行，善走逐人。名曰‘猳国’，一名‘马化’，或曰‘玃猿’。”

猕猴属于灵长目、猴科。营半树栖生活，多栖息在石山峭壁、溪旁沟谷和江河岸边的密林中或疏林岩山上，群居。以树叶、嫩枝、野菜等为食，也吃小鸟、鸟蛋、各种昆虫，甚至蚯蚓、蚂蚁。一般于11月至12月发情，次年3月至6月产仔。为重要医学实验动物，列为国家Ⅱ级重点保护野生动物，CITES列为附录-Ⅱ物种。



画名：鼯鼠

古名：鼯鼠，夷由，飞生

今名：鼯鼠，飞鼠

Sciurinae or Petauristinae



鼯鼠属于啮齿目、松鼠科、鼯鼠亚科。一般成年鼠体长约 25 厘米，尾巴几乎与身体等长。当它不张开飞膜时，外形类似松鼠。鼯鼠喜欢栖息在针叶、阔叶混交的山林中。习性类似蝙蝠，白天多躲在悬崖峭壁的岩石洞穴、石隙或树洞中休息，夜晚则外出寻食，在清晨和黄昏活动得比较频繁。它行动敏捷，善于攀爬和滑翔。以坚果、水果、植物嫩芽、昆虫和小型鸟类为食。每年春季为鼯鼠的繁殖季节，交配多在2～4月进行。



3封面故事.indd 28 2014.3.31 11:05:13 PM

画名：猬

古名：猬

今名：刺猬，猬

Erinaceidae

（大耳猬 *Hemiechinus sp.*
或达乌尔猬 *Mesechinus sp.*）



刺猬属于猬形目、猬科，是异温动物。体肥矮，爪锐利，嘴尖而长，耳小，眼小。浑身布满短而密的刺。头、尾和腹面被毛。四肢短，尾短。它的头朝腹面弯曲，身体蜷缩成一团，卷成如刺球状，栖山地、森林、草原、农田、灌丛等地，昼伏夜出。入冬后，进入冬眠，冬眠期5个月。以昆虫和蠕虫为食，也吃幼鸟、鸟蛋、蛙、蜥蜴等，偶尔也吃农作物。刺猬每年4月开始婚配生育，一年一胎。为常见种。



3封面故事.indd 29 2014.3.31 11:05:15 PM



异国兽

异国兽是指古代通过进贡、贸易等方式，从国外引进的兽类。

异国兽之“兽名”多为译音，图形及文字说明大多来自17世纪比利时人南怀仁用汉语编写的《坤舆图说》。该书初刻于康熙甲寅年（公元1674年），分上下二卷。下卷末附异物图，有动物（鸟、兽、鱼、虫等）23种。据我们考证，《兽谱》共有异国兽12种（其中有两种非兽类），其图形及文字说明，主要引自《坤舆图说》而非《古今图书集成》，因为后者所编纂的“异兽”也来自《坤舆图说》。此外，“台北中央研究院”近代史研究所赖毓芝教授在她近期发表的《乾隆朝〈兽谱〉中所涵摄之欧洲图像与知识》一文中也指出：“从《兽谱》中所转录南怀仁《坤舆图说》中有关苏、狸猴、恶纳西约、获、鼻角兽形象的记载。”



画名：利未亚狮子

古名：利未亚狮子

今名：狮子

Panthera leo


利未亞師子
利未亞州多獅性猛而傲遇者亟俯伏雖飢不噬人不見則疾走如風或衆逐之徐行孑于弗顧也惟畏雞鳴及車聲聞即遠遁當其暴烈難制擲以球輒騰躍轉弄不息說者又謂其受德必報蓋毛犀之有情者





狮子属于食肉目、猫科。狮的毛发短，体色有浅灰、黄色或茶色，雄狮还有很长的鬃毛，鬃毛有淡棕色、深棕色、黑色等。体重为180～280公斤，体长1.9～2.7米。已知狮子主要分布于非洲撒哈拉沙漠以南的草原上。狮群的捕食对象范围很广，尤其是体型中等偏上的有蹄类动物，比如斑马、羚羊。母狮可能会在任何时候进入婚配状态，妊娠期一般有100～119天，每胎1～6个。

3封面故事.indd 31 2014.3.31 11:05:22 PM

画名：鼻角兽

古名：鼻角兽

今名：犀，犀牛，独角犀，爪哇犀

Rhinoceros unicornis
或*Rhinoceros sondaicus*







犀牛属于奇蹄目、犀科。腿短，体粗壮，笨拙。体长2.3～4.3米，体重1.5~2.0吨，肩高1.1～2.05米。皮厚粗糙，并于肩腰等处成褶皱排列。耳呈卵圆形，头大而长，颈短粗。身体呈黄褐、褐、黑或灰色。毛被稀少而硬。主要分布于非洲和东南亚、南亚，是现存最大的奇蹄目动物，也是仅次于大象体型大的陆地动物。犀牛是草食动物，除了以草为主食，还吃一些水果、树叶、树枝和稻米。母犀牛每4到5年生一只小犀牛，孕期为18个月。我国西藏（东南部）及云南（西部、南部）曾有分布，但在1954年后已灭绝。CITES列为附录－Ⅰ物种。

3封面故事.indd 32 2014.3.31 11:05:24 PM

画名：意夜纳

古名：意夜纳

今名：斑鬣狗

Crocuta crocuta







斑鬣狗属于食肉目、鬣狗科。体形中等偏大，身长约125厘米，肩高80厘米左右，全身棕黄色并有乌褐色斑点，毛蓬松不光滑。主要分布于非洲撒哈拉沙漠以南的广大地区，生活在热带、亚热带草原和半荒漠地区，数量众多。大部分的食物都是靠狩猎得来，较喜欢中型的角马或斑马，亦会猎杀其他动物，包括鱼类、龟、黑犀、河马、象、鳄鱼、穿山甲、家畜、狗及人类。妊娠期约4个月，每胎1只。

3封面故事.indd 33 2014.3.31 11:05:26 PM

画名：恶那西约

古名：恶那西约

今名：长颈鹿

Giraffa camelopardalis







长颈鹿属于偶蹄目、长颈鹿科，是世界上现存最高的陆生动物。眼大而突出，位于头顶上，适宜远望。遍体具棕黄色网状斑纹。主要分布在非洲的埃塞俄比亚、苏丹、肯尼亚、坦桑尼亚和赞比亚等国，生活在非洲热带、亚热带广阔的草原上。长颈鹿喜欢采食大乔木上的树叶，还吃一些含水分的植物嫩叶。它的舌头伸长时可达50厘米以上，取食树叶极为灵巧方便。长颈鹿繁殖期不固定，孕期14～15个月，每胎产1仔。

3封面故事.indd 34 2014.3.31 11:05:29 PM

画名：般第狗

古名：般第狗

今名：河狸，海狸，水狸

Castor fiber







河狸属于啮齿目、河狸科。体型肥壮，头短而钝，眼小，耳小及颈短。门齿锋利，咬肌尤为发达。前肢短宽，无前蹼，后肢粗大。河狸多成对活动，常群居在一起，营半水栖生活。栖息在寒温带针叶林和针阔混交林的河边，穴居，洞穴在河边树根下面或水流缓慢的土质陡岸。河狸喜食多种植物的嫩枝、树皮、树根，也食水生植物。河狸每年繁殖1次，1～2月交配，4～5月产仔，每胎1～6仔。在我国仅分布于新疆北部，列为国家Ⅰ级重点保护野生动物。

3封面故事.indd 35 2014.3.31 11:05:31 PM