



doi:10.7659/j.issn.1005-6947.2024.11.003
<http://dx.doi.org/10.7659/j.issn.1005-6947.2024.11.003>
China Journal of General Surgery, 2024, 33(11):1766-1774.

· 甲状腺外科专题研究 ·

乳头样核特征的非浸润性甲状腺滤泡性肿瘤的病理特征及外科治疗：附33例报告

蔡伟, 赵菁, 李开富, 赵烨, 王亚军, 康骅

(首都医科大学宣武医院 甲状腺乳腺疾病诊疗中心, 北京 100053)

摘要

背景与目的: 甲状腺乳头状癌发病呈明显上升趋势, 因其治疗效果良好, 对其降级治疗提升生活质量成为一种趋势。病理学家将包裹性滤泡亚型乳头状癌中生物学行为更为惰性的非浸润性包裹性滤泡亚型乳头状癌更名为具有乳头样核特征的非浸润性甲状腺滤泡性肿瘤 (NIFTP), 为其治疗降级提供了理论基础。但此类疾病在实际临床病理诊断上还存在着一定的问题, 目前大多数情况下仍按经典的甲状腺乳头状癌处理。本研究探讨 NIFTP 的临床病理诊断特点及临床手术治疗中面临的问题及降级治疗的前景。

方法: 回顾性分析首都医科大学宣武医院 2017 年 11 月—2022 年 12 月期间入院, 经最后石蜡病理证实为 NIFTP 的 33 例患者的临床资料。

结果: 33 例 NIFTP 患者中, 男 11 例, 女 22 例; 平均年龄 50 岁; 肿瘤大小 0.6~7.5 cm; 单发 NIFTP 肿瘤 31 例, 多发 (均 2 处) 2 例; 11 例合并甲状腺乳头状癌 (均为 1 处), 其中 4 例与 NIFTP 同侧, 7 例位于对侧甲状腺。所有患者均行手术治疗, 常规开放手术 27 例, 腔镜手术 6 例。怀疑或不除外癌者均按甲状腺乳头状癌手术原则处理 (病变侧腺叶全切+同侧中央区淋巴结清扫)。术前超声影像特点为结节主要为低回声、形态尚规则、边界尚清楚、常伴钙化、纵横比<1。超声的 TI-RADS 分级评估 3 级 5 例、4a 级 9 例、4b 及以上 11 例。术前行穿刺者 29 例, 其中 1 例诊断为意义不明的细胞非典型病变或滤泡性病变 (AUS/FLUS), 12 例诊断为滤泡性肿瘤或可疑滤泡性肿瘤 (FN/SFN), 12 例诊断为可疑恶性肿瘤 (SUS), 4 例考虑为甲状腺乳头状癌。25 例患者术后行 BRAF^{V600E} 检测, 7 例检测到突变, 但均为合并甲状腺乳头状癌病例。

结论: NIFTP 概念的提出, 对某些侵袭性较弱的甲状腺肿瘤的降级或个体化治疗提供了依据。但在实际的临床诊疗中, 术前及术中 NIFTP 诊断目前仍比较困难。所以, 使手术医师改变治疗决策还需要更加准确的术前诊断标准及诊断方法。

关键词

甲状腺肿瘤/诊断; 甲状腺肿瘤/治疗; NIFTP

中图分类号: R736.1

Pathologic features and surgical treatment of noninvasive follicular thyroid neoplasm with papillary-like nuclear features: a report of 33 cases

CAI Wei, ZHAO Jing, LI Kaifu, ZHAO Ye, WANG Yajun, KANG Hua

(Center for Thyroid and Breast Surgery, Xuanwu Hospital Capital Medical University, Beijing 100053, China)

收稿日期: 2023-12-18; 修订日期: 2024-05-09。

作者简介: 蔡伟, 首都医科大学宣武医院副主任医师, 主要从事甲状腺乳腺疾病诊治方面的研究。

通信作者: 康骅, Email: kanghua@xwh.ccmu.edu.cn

Abstract

Background and Aims: The incidence of papillary thyroid carcinoma (PTC) has shown a significant upward trend. Given its favorable prognosis, there is a growing trend toward de-escalating its treatment to improve patients' quality of life. Pathologists have renamed the encapsulated follicular variant of PTC with indolent biological behavior as noninvasive follicular thyroid neoplasm with papillary-like nuclear features (NIFTP), providing a theoretical basis for treatment de-escalation. However, challenges persist in the clinical pathological diagnosis of NIFTP, and it is still predominantly managed as classical PTC in most cases. This study was performed to explore the clinicopathologic diagnostic characteristics, surgical challenges, and prospects for de-escalation treatment of NIFTP.

Methods: The clinical data of 33 patients with thyroid disease who were admitted to Xuanwu Hospital Capital Medical University from November 2017 to December 2022 and confirmed as NIFTP by final paraffin pathology were retrospectively analyzed.

Results: Among the 33 NIFTP patients, there were 11 males and 22 females, with an average age of 50 years. Tumor sizes ranged from 0.6 to 7.5 cm. There were 31 cases of solitary NIFTP tumor and 2 cases of multifocal tumors (each involving 2 sites). Eleven patients had coexisting PTC (one lesion in each case), with 4 lesions located on the same side as the NIFTP and 7 on the opposite side. All patients underwent surgical treatment, including 27 cases of conventional open surgery and 6 cases of endoscopic surgery. Suspicious or potentially malignant lesions were treated according to PTC surgical principles (lobectomy of the affected side plus central compartment lymph node dissection on the same side). Preoperative ultrasonography revealed that the nodules were predominantly hypoechoic, relatively regular in shape, well-defined, often accompanied by calcifications, and had a longitudinal-to-transverse diameter ratio of <1 . TI-RADS classifications were as follows: 5 cases as grade 3, 9 cases as grade 4a, and 11 cases as grade 4b or higher. Among 29 patients who underwent preoperative fine-needle aspiration, 1 case was diagnosed as atypia of undetermined significance/follicular lesion of undetermined significance (AUS/FLUS), 12 as follicular neoplasm/suspicious for follicular neoplasm (FN/SFN), 12 as suspicious for malignancy (SUS), and 4 as PTC. BRAF^{V600E} mutation testing was performed postoperatively in 25 cases, and 7 mutations were detected, all in cases with concomitant PTC.

Conclusion: The introduction of the NIFTP concept provides a foundation for de-escalation or individualized treatment of certain less aggressive thyroid tumors. However, the preoperative and intraoperative diagnosis of NIFTP remains challenging in clinical practice. More precise preoperative diagnostic criteria and methods are needed to enable surgeons to adjust treatment decisions accordingly.

Key words

Thyroid Neoplasms/diag; Thyroid Neoplasms/ther; NIFTP

CLC number: R736.1

近年来,甲状腺癌的发病率在全球呈明显的上升趋势,其中甲状腺乳头状癌最为明显^[1]。其原因考虑可能与检诊技术的提高^[2]及肿瘤筛查的普及有关。因其良好的预后,很多学者认为甲状腺乳头状癌有过度诊治之虞,所以对其降级治疗甚至等待观察的观点不断出现^[3-4]。但甲状腺乳头状癌也并非都是低危癌,局部侵犯及较高的颈部淋巴结转移率也是根治性手术治疗的重点之一。所以如何筛选出生物学行为良好,侵袭性较弱的甲状

腺癌进行治疗的降级成为学者们关注的问题。2016年,来自匹兹堡大学的 Nikiforov 等^[5]对相关甲状腺癌病理及临床治疗结果进行了观察,发现包裹性滤泡亚型乳头状癌(encapsulated follicular variant of papillary thyroid cancer, EFVPTC)生物学行为相对惰性,而临床治疗却大部分还是按照经典的甲状腺乳头状癌来处理,因此认为有必要对此进行“纠偏”,提出将非浸润性 EFVPTC 命名为具有乳头样核特征的非浸润性甲状腺滤泡性肿瘤

(noninvasive follicular thyroid neoplasm with papillary-like nuclear features), 简称为NIFTP。随后对其诊断标准进行了描述和修订。在2017年版世界卫生组织(WHO)内分泌器官肿瘤分类中,NIFTP被纳入其中,对甲状腺癌病理研究及临床诊治带来了重要的影响^[6]。但NIFTP仍是一种具有恶性潜能的“低风险肿瘤”,对于组织学或细胞学诊断为NIFTP的患者,目前仍推荐手术切除治疗,但可仅行患侧甲状腺腺叶切除,而无需预防性颈部淋巴结清扫及术后放射性碘(radioactive iodine, RAI)治疗^[7]。然而,NIFTP的准确诊断需要手术切除后对整个肿瘤包括包膜进行完整的镜下评估^[8],术前穿刺病理及术中冷冻病理诊断目前仍较为困难,所以临床外科医师对于此类病例手术中的治疗选择仍面临具体的困难。本研究对首都医科大学宣武医院自2017年11月以来收治的最终病理诊断为NIFTP的33例患者进行回顾性分析,对此类疾病诊治过程的一些特点和遇到的问题进行探讨,从而使临床医生对此类患者的临床病理特点更加明确,治疗更加个性化。

1 资料与方法

回顾性分析首都医科大学宣武医院2017年11月—2022年12月期间甲状腺患者的临床资料,经最后石蜡病理证实为NIFTP者33例。

术前均行本院甲状腺B超检查,对甲状腺结节的回声、大小、形状、边界、纵横比、血流等特点进行观察,并根据中国版甲状腺成像报告和数据库系统(Thyroid Imaging Reporting and Data System, TI-RADS)^[9],1级:正常;2级:良性病变;3级:可能良性;4级(4a、4b、4c):可能恶性;5级:高度恶性;6级:病理证实恶性,对其甲状腺结节的恶性可能进行评估。

凡超声影像评估4级以上(怀疑恶性可能者),建议行细针细胞学穿刺活检(fine-needle aspiration, FNA)。相关病例的细胞学评估采用广泛使用的甲状腺细胞病理学Bethesda报告系统(The Bethesda System for Reporting of Thyroid Cytopathology, TBSRTC)标准^[10],包括六类结果:(1)标本无法诊断;(2)良性病变;(3)意义不明的细胞非典型病变或滤泡性病变(AUS/FLUS);(4)滤泡性肿瘤或可疑滤泡性肿瘤(FN/SFN);(5)可疑恶

性肿瘤(SUS);(6)恶性肿瘤。对于FNA诊断考虑乳头状癌或不除外癌者(部分3类,4~6类),或术中冷冻不除外乳头状癌或考虑滤泡性肿瘤者行进一步手术治疗(病变侧腺叶切除+同侧中央区淋巴结清扫)。所有患者手术标本术后常规石蜡病理检查。对于NIFTP的诊断,病理科依据Nikiforov等^[5]在2016年提出的初始诊断标准,2018年提出的修订标准^[11],以及2022年WHO分类^[12]的诊断标准进行诊断。主要标准:有包膜或境界清楚;滤泡状生长,包括无形成良好的乳头状结构(无具有纤维血管轴心的乳头状结构),无砂粒体,实性/梁状/岛状生长方式<30%;具有乳头状癌核特征,核评分2~3;无血管或包膜浸润,无肿瘤坏死,无较高的核分裂活性(核分裂指数<3个/HPF)。次要标准:分子检测或免疫组化检测无BRAF^{V600E}突变;无BRAF^{V600E}样突变(如RET/PTC融合)或其他高危突变(如TERT、TP53突变)。

大部分患者手术标本术后加行BRAF^{V600E}免疫组化和/或分子生物学基因检测。部分病例行RAS基因的突变检测。随访4~50个月。本研究获得首都医科大学宣武医院伦理委员会批准(批号:临研审〔2020〕055号)。同意申请免除知情同意和知情同意书签字。

2 结果

2.1 临床特点及手术治疗

术后石蜡病理诊断为NIFTP的33例患者中,男性11例,女性22例;年龄27~69岁,平均50岁。肿瘤大小为1.1(0.6~7.5)cm。单发NIFTP肿瘤31例,多发(均2处)2例,均位于右侧甲状腺1例,分别位于左、右甲状腺1例。病变位于左甲状腺者15例,右侧甲状腺者17例,双侧甲状腺者1例。11例合并甲状腺乳头状癌(均为1处),乳头状癌大小为0.2~1.1cm,其中4例与NIFTP同侧,7例位于对侧甲状腺。33例NIFTP患者均行手术治疗,常规开放手术27例,腔镜手术6例(全乳晕入路5例,腋入路1例)。手术切除范围:19例行单侧甲状腺腺叶+峡部切除+同侧中央区淋巴结清扫;5例行甲状腺全切+病变侧中央区淋巴结清扫;2例行双侧甲状腺全切+双侧中央区淋巴结清扫;6例仅行单侧甲状腺腺叶+峡部切除;1例行甲状腺全切。单纯NIFTP患者术后常规服用左甲状

腺素治疗,其促甲状腺激素(TSH)水平控制在正常值下限水平左右。而 NIFTP 合并甲状腺乳头状癌患者按乳头状癌术后管理进行,将 TSH 控制在 <0.1 mU/L,并随着随访进行动态调整。随访 4~50 个月,均无复发转移证据。

2.2 超声特点

结节为低回声 22 例,等回声 9 例,不均回声 4 例。形态规则或尚规则者 28 例,欠规则或不规则者 7 例。边界清楚或尚清楚者 28 例,边界欠清或不清楚者 7 例。周围伴低回声晕者 4 例,均为病灶较大者(1.8~4.9) cm。伴钙化者 11 例:点状钙化 8 例,斑块状或环形钙化 3 例。纵横比≥1 者 6 例,纵横比<1 者 29 例。结节周围及内部血流丰富者 12 例,可见者 18 例,未见者 5 例。影像学 TI-RADS 分级主要集中在 4 级,包括 3 级 5 例,4a 级 19 例,4b 级及以上 11 例(表 1)(图 1)。

表 1 33 例 NIFTP 患者 35 个病灶超声特征[n (%)]
Table 1 Ultrasound characteristics of 35 lesions in 33 NIFTP patients [n (%)]

超声特征	数值
回声	
低回声	22(62.9)
等回声	9(25.7)
不均回声	4(11.4)
形状	
(尚)规则	28(80.0)
不或欠规则	7(20.0)
边界	
(尚)清晰	28(80.0)
不或欠清晰	7(20.0)
伴声晕	4(11.4)
伴钙化	11(31.4)
纵横比	
≥1	6(17.1)
<1	29(82.9)
周围及内部血流	
丰富	12(34.3)
可见	18(51.4)
未见	5(14.3)
TI-RADS 分级	
3 级	5(14.3)
4a 级	19(54.3)
4b 级及以上	11(31.4)




图 1 NIFTP 患者超声影像表现(甲状腺内可见低回声实性结节,大小 1.1 cm×1.0 cm×0.9 cm,形态尚规则,边界清,周边可见晕环,内部可见散在小的液性透声区,CDFI: 结节周边可见较丰富血流信号; TI-RADS 4a 级,可疑甲状腺癌)

Figure 1 Ultrasonographic findings in an NIFTP patient (A hypoechoic solid nodule is visible within the thyroid, measuring 1.1 cm × 1.0 cm × 0.9 cm; the nodule has a relatively regular shape, well-defined margins, and a peripheral halo; scattered small anechoic areas are observed within the nodule; CDFI shows abundant blood flow signals around the nodule; TI-RADS classification: grade 4a, suspicious for thyroid carcinoma)

2.3 病理特点

有 5 例患者术前考虑良性可能性大,术前未行 FNA,均因有压迫表现行手术治疗,术后病理证实为 NIFTP。两灶(NIFTP)位于同侧的患者仅穿刺了较大病灶,较小病灶未穿刺。故术前共穿刺病灶 29 处(表 2)。1 例患者术前穿刺诊断为 AUS/FLUS。12 例患者诊断为 FN/SFN(图 2)。12 例患者诊断为 SUS。4 例患者诊断为甲状腺乳头状癌。其中 8 例患者术中加做了冷冻病理检查,均未提示或诊断 NIFTP: 5 例考虑或不除外滤泡性肿瘤,2 例不除外乳头状癌,1 例考虑乳头状癌。33 例患者中,术后病理有 25 例患者进行了 BRAF 基因检测,7 例患者 BRAF^{V600E}检测到突变,但均为合并甲状腺乳头状癌病例。而只有 4 例患者进行了 RAS 基因检测,其中 2 例检测出 KRAS 基因突变,另 2 例未检测到突变。4 例患者术后病理发现中央区淋巴结转移,但均合并有甲状腺乳头状癌。

表 2 NIFTP 患者术前 FNA TBSRTC 报告结果[n (%)]
Table 2 The TBSRTC results of preoperative FNA of the patients with NIFTP [n (%)]

TBSRTC 分类	数值
标本无法诊断	0(0.0)
良性病变	0(0.0)
AUS/FLUS	1(3.4)
FN/SFN	12(41.4)
SUS	12(41.4)
恶性肿瘤	4(13.8)




图 2 FNA 病理（镜下散在及灶状甲状腺滤泡上皮细胞，部分区域呈微滤泡结构，胞浆丰富，部分细胞核增大，呈毛玻璃样，偶见核沟，未见明确核内假包涵体，不除外滤泡性肿瘤；TBSRTC 4 类，FN/SFN；HE×400）

Figure 2 FNA pathology (Microscopic examination shows scattered and focal thyroid follicular epithelial cells, with some areas displaying a microfollicular structure; the cytoplasm is abundant, and some nuclei are enlarged with a ground-glass appearance; occasional nuclear grooves are observed, but no definitive intranuclear pseudoinclusions are identified; Follicular neoplasm cannot be excluded; TBSRTC category 4, FN/SFN; HE×400)

3 讨 论

自 2017 年 WHO 将 NIFTP 纳入内分泌器官肿瘤组织分类中，其受到了越来越多的重视。在欧洲和北美等国家，NIFTP 约占所有甲状腺癌的 13.3%，而在亚洲约占 1.6%^[13]。所以 NIFTP 命名的提出，对甲状腺癌的组成占比产生了一定的影响。2017 年第二版 TBSRTC^[10]就 NIFTP 也做了相应的更新，使其术前的诊断或提示诊断成为可能。NIFTP 的提出和确定，为这部分极低度恶性潜能肿瘤避免过度

治疗提供了理论基础，可以减轻国家社会的医疗负担和患者的心理负担^[14]，但 NIFTP 的诊断和治疗仍面临着许多现实的问题。

首先，在 NIFTP 的诊断方面，尽管 2017 版 TBSRTC 对 FNA 诊断 NIFTP 规定了相应的诊断标准，但 FNA 中 NIFTP 并没有单一特征性细胞学特征，其与甲状腺其他良性及恶性肿瘤的细胞学特性都有重叠，使 NIFTP 的术前诊断成为一个挑战。但 NIFTP 也有病理特征的一些倾向性，为其诊断提供了思路。从结构性特点看，NIFTP 的细胞团主要以微滤泡为主^[15]；从细胞核特征看，轻度核增大是最常见的核特征之一^[15-16]，核沟很常见^[15, 17]，核染色质透明或呈毛玻璃样核^[15-16, 18]，但核内假包涵体少见^[15, 17-18]。核评分通常是 2 分^[19]，这也说明 NIFTP 的细胞核异型性大于正常而小于癌。但 2017 版 TBSRTC 并未像有些学者^[19-20]建议的那样为 NIFTP 增加一个独立的分类，而仍采用原来的六分类诊断^[21]。从理论上讲，在实际判读中，如果微滤泡结构显著而乳头样核特征不典型，将容易被判读为 FN/SFN，反之乳头样核特征较明显，而滤泡结构不典型则可能会判为 AUS/FLUS 或可疑乳头状癌。而相关研究^[22]也证实，最终的 NIFTP 病例集中来源于 FNA 细胞学判读的三个中间型分类（AUS/FLUS 30%；FN/SFN 21%；SUS 24%），共约占 75%，从而进一步影响了各分类的 TBSRTC 恶性风险的评估。如果 NIFTP 不诊断为癌，以上三个分类的恶性风险由 10%~30%、25%~40%、50%~75% 分别降至 6%~18%、10%~40%、45%~60%^[10]。本研究 29 处病灶有 25 处的 FNA 判读为以上三个中间类型，占比约为 86%（25/29），结果类似，但 AUS/FLUS 较少（1 例），而主要集中在 FN/SFN 和 SUS（各 12 例）。所以，NIFTP 被直接判为良性或恶性的可能性一般不大。2017 版 TBSRTC 在 FN/SFN、SUS 及恶性这三个诊断类别增加了注释性报告模式，当细胞学特征提示可能存在 NIFTP 时，可在报告内选择性地注释其可能性^[10]。但是在现实的临床工作中，因为 NIFTP 与 EFVPTC、经典甲状腺乳头状癌在细胞学特征中有许多重叠，所以病理科医生从诊断安全上考虑，给予明确的诊断或提示性诊断可能较小。本研究 25 例病例中，术前穿刺 21 例，无 1 例术前穿刺提示 NIFTP。其实 NIFTP 不是一种细胞学诊断，NIFTP 被定义为组织学实体^[23]，在细胞学诊断水平，明确诊断 NIFTP 确有困难。这也给相应的

后续治疗带来了难度。而术中冷冻的组织学检查,虽然可以取得完整病变(肿瘤)进行检查,但冷冻病理自身的局限性,无法对整个病变进行标准薄层的切片以确定有无包膜、脉管侵犯及其他病理特点,如有无真正的乳头结构,有无砂粒体等。对“整个肿瘤进行检查”不仅在冷冻病理难以实现,即便是术后石蜡病理也困难重重^[24]。

超声及多普勒图像在甲状腺结节良恶性判断上有着重要的作用^[25]。在超声影像上,NIFTP是一种圆形或椭圆形、边界清楚、回声不等的结节,可为低回声、等回声或非均质,倾向于良性表现^[26-27]。还有一些 NIFTP 表现出边缘不清,形状不规则,有钙化及纵横比>1 等甲状腺乳头状癌的表现。NIFTP 结节在超声诊断中通常不表现为高度可疑性(TI-RADS 5 级),在 EFVPTC 中表现为 TI-RADS 5 级的频率也较低,但在浸润性 EFVPTC 中的频率较高^[28-30]。大部分 NIFTP 被划分为轻度可疑(TI-RADS 3 级)和中度可疑(TI-RADS 4 级)^[31-32]。本研究中,NIFTP 结节的采用 TI-RADS 分级,主要集中在 4a 级附近,与以上文献结果类似。另外,本研究中有 11 例 NIFTP 患者的病变合并有钙化,但病变中的钙化似乎与 NIFTP 病理诊断中的砂粒体无关。而 NIFTP 结节周围及内部血运相对丰富(丰富者 12 例,可见者 18 例),仅 5 例未见血流信号。有研究^[33]为探讨甲状腺结节富血运是否为恶性肿瘤,对 698 枚甲状腺结节进行了调查,发现结节内血管增生血运丰富与腺瘤/腺瘤样甲状腺结节之间存在显著关联,但甲状腺乳头状癌却表现为缺乏血管充血。因此,NIFTP 在超声影像上与纤维腺瘤,滤泡亚型的甲状腺乳头状癌甚至经典的甲状腺乳头状癌都有许多重叠,缺乏特异性。所以仅依靠超声影像学,并不能获得满意的诊断率。但术前的超声检查可以显示甲状腺结节的整体信息,可提供结节的边界及包膜特点,弥补 FNA 的不足。如果穿刺病理表现出 NIFTP 特征,可结合结节的超声影像学特点进行评估,此外如影像学未显示充分浸润证据,提倡备注 NIFTP 的可能诊断。

分子生物学分析对于甲状腺癌的诊断及指导治疗有重要的作用。对于 NIFTP 的诊断也有一定程度的帮助。NIFTP 中无 BRAF^{V600E} 突变,缺乏 BRAF^{V600E} 样突变或 TERT、TP53 等其他高危突变^[11]。而对于那些乳头状癌核特征突出的病例,除对整个肿瘤进行检查以排除乳头状结构之外,还推荐行

BRAF^{V600E} 突变的分子检测,如检测阴性,有助于 NIFTP 诊断。本研究中,25 例患者术后行病理行 BRAF^{V600E} 检测,21 例未检测到突变。4 例检测到突变,但均合并经典型甲状腺乳头状癌,其突变阳性考虑与合并的乳头状癌有关。虽然 NIFTP 中也可以检测到 BRAF 突变,但通常是 BRAF^{K601E} 突变,而非 BRAF^{V600E} 突变。与 BRAF^{V600E} 突变相比,BRAF^{K601E} 突变的预后更好^[34-37]。而 NIFTP 中最常检测到的基因异常是 RAS 基因突变(30%~67%),RAS 基因突变的检测有助于鉴别 NIFTP,EFVPTC 或经典乳头状癌^[38-40]。此外,NIFTP 中也少量存在 PAX8-PARG γ 易位和 THADA 重排^[8, 38, 41]。

另外,在 NIFTP 的治疗方面同样也存在着许多问题。NIFTP 具有较好的生物学行为,预后非常好,转移及复发的风险也极低^[5, 7, 42]。但 NIFTP 不是一种“良性肿瘤”,而是目前甲状腺肿瘤中最常见的一种交界性肿瘤^[43],具有恶性潜能,所以需要手术切除进行诊断,并对整个肿瘤包括包膜进行完整的显微镜评估^[44]。对于组织学或细胞学诊断为 NIFTP 的患者,目前仍推荐手术切除治疗。Nikiforov 等^[5]对 67 例 NIFTP 患者仅行患侧甲状腺叶切除而无碘-131 (¹³¹I) 治疗,随访 10~26 年未发现颈部淋巴结转移、远处转移和死亡的情况发生。Thompson 等^[45]报道了 75 例 NIFTP 患者的术后随访结果,这些患者同样只进行手术切除(腺叶切除 41 例,甲状腺全切 34 例)而无术后 ¹³¹I 治疗,随访 11.8 年未发现疾病有进展情况。即使在肿瘤较大(>4 cm)、没有 RAI 治疗的情况下,相对保守的手术治疗(甲状腺腺叶切除)也能获得较好的治疗效果(32 例患者随访 11.2 年无复发)^[46]。所以许多学者建议对于此类型肿瘤的治疗可仅行患侧甲状腺腺叶切除,无需术后 RAI 治疗及预防性颈部淋巴结清扫^[47],而一些亚洲的学者甚至认为仅诊断性腺叶切除术也是有害的^[48]。NIFTP 提出的目的是希望将一些低风险肿瘤分离出来,以避免过度治疗,从而节省医疗资源和改善生活质量。但现实似乎并不像病理学家们想的那么简单,NIFTP 与一些典型的乳头状癌之间可能存在许多的重叠^[49],而确定真正低风险的 NIFTP,还必须建立更准确的病理组织学标准,或辅助其他方法如分子生物学方法、影像学等。而在大多数情况下,术前临床及病理检查仅能给出怀疑 NIFTP 的诊断,即便术中冷冻检查,也不能最终明确诊断。所以术中手术医师将面临选

择：保守还是保险。由于对肿瘤的恐惧和结果的担心，大多数患者或医师可能都会选择保险。本研究中，除术前考虑为良性病变者，术前诊断怀疑 NIFTP 及怀疑乳头状癌者，均行患侧中央区淋巴结清扫，也是无法术前或术中获得明确 NIFTP 诊断的无奈之举。NIFTP 的提出原本是减少低风险甲状腺肿瘤的过度治疗，但除肿瘤较大的 NIFTP 患者可以豁免术后 ^{131}I 治疗外，其他 NIFTP 患者似乎获益并不明显。此外，NIFTP 也经常合并乳头状癌^[50]，也会使手术治疗变得更为复杂。本研究中有 11 例合并乳头状癌，其中 4 例出现中央区淋巴结转移，也为建议对 NIFTP 行相对保守治疗的学者敲了警钟。

总之，NIFTP 的提出为甲状腺肿瘤的精细化、个体化诊治提供了一个很好的尝试，符合甲状腺外科的总体发展理念。但实际临床诊疗中，病理科医师能否很好地掌握 NIFTP 诊断标准并给予提示，术前或术中无法获得令人满意的诊断仍会困扰手术医师。本研究为回顾性研究，病例数较少，仅对临床的现实问题进行了分析和探讨，而对于问题的解决还需不断尝试和大宗病例的研究。相信随着病理实践的不断完善，随访及各项评估观察的充实，甲状腺肿瘤的临床管理将会越来越精准。

利益冲突：所有作者均声明不存在利益冲突。

作者贡献声明：蔡伟参与研究设计、数据收集、数据分析及论文撰写；赵菁、李开富、赵烨、王亚军参与数据收集；康骅参与研究设计，论文审阅。

参考文献

- [1] Kitahara CM, Sosa JA, Shiels MS. Influence of nomenclature changes on trends in papillary thyroid cancer incidence in the United States, 2000 to 2017[J]. *J Clin Endocrinol Metab*, 2020, 105(12):e4823–e4830. doi:10.1210/clinem/dgaa690.
- [2] 李长霖, 周乐, 孙辉. 我国甲状腺结节细针穿刺活检技术应用现状及进展[J]. *中国实用外科杂志*, 2020, 40(2): 195–198. doi: 10.19538/j.cjps.issn1005–2208.2020.02.13.
- [3] Li CL, Zhou L, Sun H. Status and progress of fine needle aspiration biopsy for thyroid nodules in China[J]. *Chinese Journal of Practical Surgery*, 2020, 40(2): 195–198. doi: 10.19538/j. cjps. issn1005–2208.2020.02.13.
- [4] Beg S, Khan SI, Cui I, et al. Analysis of a pre-2017 follicular variant papillary thyroid carcinoma cohort reclassified as noninvasive follicular thyroid neoplasm with papillary-like features (NIFTP): an 11-year retrospective single institution experience[J]. *J Am Soc Cytopathol*, 2023, 12(2): 112–119. doi: 10.1016/j.jasc.2022.09.006.
- [5] Haugen BR, Sawka AM, Alexander EK, et al. American thyroid association guidelines on the management of thyroid nodules and differentiated thyroid cancer task force review and recommendation on the proposed renaming of encapsulated follicular variant papillary thyroid carcinoma without invasion to noninvasive follicular thyroid neoplasm with papillary-like nuclear features[J]. *Thyroid*, 2017, 27(4):481–483. doi:10.1089/thy.2016.0628.
- [6] Nikiforov YE, Seethala RR, Tallini G, et al. Nomenclature revision for encapsulated follicular variant of papillary thyroid carcinoma: a paradigm shift to reduce overtreatment of indolent tumors[J]. *JAMA Oncol*, 2016, 2(8): 1023–1029. doi: 10.1001/jamaoncol.2016.0386.
- [7] Amendoeira I, Maia T, Sobrinho-Simões M. Non-invasive follicular thyroid neoplasm with papillary-like nuclear features (NIFTP): impact on the reclassification of thyroid nodules[J]. *Endocr Relat Cancer*, 2018, 25(4):R247–R258. doi:10.1530/ERC-17-0513.
- [8] Chereau N, Greilsamer T, Mirallié E, et al. NIFT-P: Are they indolent tumors? Results of a multi-institutional study[J]. *Surgery*, 2019, 165(1):12–16. doi:10.1016/j.surg.2018.04.089.
- [9] Zajkowska K, Kopczyński J, Gózdź S, et al. Noninvasive follicular thyroid neoplasm with papillary-like nuclear features: a problematic entity[J]. *Endocr Connect*, 2020, 9(3):R47–R58. doi: 10.1530/EC-19-0566.
- [10] Zhou J, Yin L, Wei X, et al. 2020 Chinese guidelines for ultrasound malignancy risk stratification of thyroid nodules: the C-TIRADS[J]. *Endocrine*, 2020, 70(2):256–279. doi:10.1007/s12020-020-02441-y.
- [11] Cibas ES, Ali SZ. The 2017 Bethesda system for reporting thyroid cytopathology[J]. *Thyroid*, 2017, 27(11): 1341–1346. doi: 10.1089/thy.2017.0500.
- [12] Nikiforov YE, Baloch ZW, Hodak SP, et al. Change in diagnostic criteria for noninvasive follicular thyroid neoplasm with papillarylike nuclear features[J]. *JAMA Oncol*, 2018, 4(8): 1125–1126. doi:10.1001/jamaoncol.2018.1446.
- [13] Baloch ZW, Asa SL, Barletta JA, et al. Overview of the 2022 WHO classification of thyroid neoplasms[J]. *Endocr Pathol*, 2022, 33(1): 27–63. doi:10.1007/s12022-022-09707-3.
- [14] Bychkov A, Jung CK, Liu Z, et al. Noninvasive follicular thyroid neoplasm with papillary-like nuclear features in Asian practice:

- perspectives for surgical pathology and cytopathology[J]. *Endocr Pathol*, 2018, 29(3):276–288. doi:10.1007/s12022-018-9519-6.
- [14] Na HY, Park SY. Noninvasive follicular thyroid neoplasm with papillary-like nuclear features: its updated diagnostic criteria, preoperative cytologic diagnoses and impact on the risk of malignancy[J]. *J Pathol Transl Med*, 2022, 56(6): 319–325. doi: 10.4132/jptm.2022.09.29.
- [15] Zhang Z, Chhieng D, Harshan M, et al. Cytological features of noninvasive follicular thyroid neoplasm with papillary-like nuclear features (NIFTP)[J]. *J Am Soc Cytopathol*, 2019, 8(1):5–10. doi: 10.1016/j.jasc.2018.07.007.
- [16] Bizzarro T, Martini M, Capodimonti S, et al. Young investigator challenge: the morphologic analysis of noninvasive follicular thyroid neoplasm with papillary-like nuclear features on liquid-based cytology: some insights into their identification[J]. *Cancer Cytopathol*, 2016, 124(10):699–710. doi:10.1002/cncy.21777.
- [17] Chandler JB, Colunga M, Prasad ML, et al. Identification of distinct cytomorphologic features in the diagnosis of NIFTP at the time of preoperative FNA: implications for patient management[J]. *Cancer Cytopathol*, 2017, 125(11): 865–875. doi: 10.1002/cncy.21910.
- [18] Brandler TC, Zhou F, Liu CZ, et al. Can noninvasive follicular thyroid neoplasm with papillary-like nuclear features be distinguished from classic papillary thyroid carcinoma and follicular adenomas by fine-needle aspiration? [J]. *Cancer Cytopathol*, 2017, 125(6):378–388. doi:10.1002/cncy.21848.
- [19] Strickland KC, Vivero M, Jo VY, et al. Preoperative cytologic diagnosis of noninvasive follicular thyroid neoplasm with papillary-like nuclear features: a prospective analysis[J]. *Thyroid*, 2016, 26(10):1466–1471. doi:10.1089/thy.2016.0280.
- [20] Hirokawa M, Higuchi M, Suzuki A, et al. Noninvasive follicular thyroid neoplasm with papillary-like nuclear features: a single-institutional experience in Japan[J]. *Endocr J*, 2017, 64(12): 1149–1155. doi:10.1507/endocrj.EJ17-0214.
- [21] Cibas ES, Ali SZ. The Bethesda system for reporting thyroid cytopathology[J]. *Am J Clin Pathol*, 2009, 132(5): 658–665. doi: 10.1309/ajcpplwmi3jv4la.
- [22] Bongiovanni M, Giovanella L, Romanelli F, et al. Cytological diagnoses associated with noninvasive follicular thyroid neoplasms with papillary-like nuclear features according to the Bethesda system for reporting thyroid cytopathology: a systematic review and meta-analysis[J]. *Thyroid*, 2019, 29(2):222–228. doi:10.1089/thy.2018.0394.
- [23] Kholová I, Haaga E, Ludvik J, et al. Noninvasive follicular thyroid neoplasm with papillary-like nuclear features (NIFTP): tumour entity with a short history. A review on challenges in our microscopes, molecular and ultrasonographic profile[J]. *Diagnostics*, 2022, 12(2):250. doi:10.3390/diagnostics12020250.
- [24] Stojanov IJ, Mete O, Asa SL. Obstacles to tumor capsule assessment in noninvasive follicular thyroid neoplasm with papillary-like nuclear features (NIFTP)[J]. *Endocr Pathol*, 2023, 34(4):484–486. doi:10.1007/s12022-023-09791-z.
- [25] 何巧, 李芳, 孙辉. 甲状腺超声影像报告与数据系统的应用和研究进展[J]. *中国普通外科杂志*, 2018, 27(11): 1477–1482. doi: 10.7659/j.issn.1005-6947.2018.11.017.
- He Q, Li F, Sun H. Application of thyroid imaging reporting and data system and its research progress[J]. *China Journal of General Surgery*, 2018, 27(11): 1477–1482. doi: 10.7659/j. issn. 1005-6947.2018.11.017.
- [26] Kwon MR, Shin JH, Hahn SY, et al. Histogram analysis of greyscale sonograms to differentiate between the subtypes of follicular variant of papillary thyroid cancer[J]. *Clin Radiol*, 2018, 73(6):591.e1–591.e7. doi:10.1016/j.crad.2017.12.008.
- [27] Yang GCH, Fried KO. Pathologic basis of the sonographic differences between thyroid cancer and noninvasive follicular thyroid neoplasm with papillary-like nuclear features[J]. *Ultrasonography*, 2018, 37(2):157–163. doi:10.14366/usg.17045.
- [28] Lee HS, Lee JW, Park JH, et al. Comprehensive analysis for diagnosis of preoperative non-invasive follicular thyroid neoplasm with papillary-like nuclear features[J]. *PLoS One*, 2019, 14(7): e0218046. doi:10.1371/journal.pone.0218046.
- [29] Hahn SY, Shin JH, Oh YL, et al. Role of ultrasound in predicting tumor invasiveness in follicular variant of papillary thyroid carcinoma[J]. *Thyroid*, 2017, 27(9): 1177–1184. doi: 10.1089/thy.2016.0677.
- [30] Boursier L, Clerc Urmes I, Garon J, et al. Ultrasound and cytological characteristics of non-invasive follicular thyroid neoplasm with papillary-like nuclear features compared to papillary carcinomas[J]. *Ann Endocrinol (Paris)*, 2020, 81(1): 28–33. doi: 10.1016/j.ando.2019.10.004.
- [31] Rosario PW. Is Doppler ultrasonography of value for the differentiation between noninvasive follicular thyroid neoplasm with papillary-like nuclear features (NIFTP) and invasive encapsulated follicular variant of papillary thyroid carcinoma? [J]. *Clin Endocrinol (Oxf)*, 2018, 88(3): 506–507. doi: 10.1111/cen.13523.
- [32] Leoncini A, Camponovo C, Gamarra E, et al. NIFTP-adjusted risk estimation of Bethesda thyroid cytology categories should consider the indication for FNA according to TIRADS[J]. *Endocrine*, 2024. doi:10.1007/s12020-024-03800-9.[Online ahead of print]
- [33] Yang GCH, Fried KO. Most thyroid cancers detected by sonography lack intranodular vascularity on color Doppler

- imaging: review of the literature and sonographic-pathologic correlations for 698 thyroid neoplasms[J]. *J Ultrasound Med*, 2017, 36(1):89–94. doi:10.7863/ultra.16.03043.
- [34] Afkhami M, Karunamurthy A, Chiosea S, et al. Histopathologic and clinical characterization of thyroid tumors carrying the BRAF (K601E) mutation[J]. *Thyroid*, 2016, 26(2):242–247. doi:10.1089/thy.2015.0227.
- [35] Johnson DN, Furtado LV, Long BC, et al. Noninvasive follicular thyroid neoplasms with papillary-like nuclear features are genetically and biologically similar to adenomatous nodules and distinct from papillary thyroid carcinomas with extensive follicular growth[J]. *Arch Pathol Lab Med*, 2018, 142(7): 838–850. doi:10.5858/arpa.2017–0118–OA.
- [36] Geramizadeh B, Maleki Z. Non-invasive follicular thyroid neoplasm with papillary-like nuclear features (NIFTP): a review and update[J]. *Endocrine*, 2019, 64(3): 433–440. doi:10.1007/s12020–019–01887–z.
- [37] 周武琳, 程晓明, 吕俊远, 等. 基于FNAB的分子检测技术在甲状腺结节诊断中的研究进展[J]. *中国普通外科杂志*, 2021, 30(5): 613–621. doi:10.7659/j.issn.1005–6947.2021.05.015.
- Zhou WL, Cheng XM, Lu JY, et al. Research progress of molecular detection technologies based on FNAB in diagnosis of thyroid nodules[J]. *China Journal of General Surgery*, 2021, 30(5): 613–621. doi:10.7659/j.issn.1005–6947.2021.05.015.
- [38] Zhao LN, Dias-Santagata D, Sadow PM, et al. Cytological, molecular, and clinical features of noninvasive follicular thyroid neoplasm with papillary-like nuclear features versus invasive forms of follicular variant of papillary thyroid carcinoma[J]. *Cancer Cytopathol*, 2017, 125(5):323–331. doi:10.1002/cncy.21839.
- [39] Paulson VA, Shivdasani P, Angell TE, et al. Noninvasive follicular thyroid neoplasm with papillary-like nuclear features accounts for more than half of “carcinomas” harboring RAS mutations[J]. *Thyroid*, 2017, 27(4):506–511. doi:10.1089/thy.2016.0583.
- [40] Pusztaszeri M, Bongiovanni M. The impact of non-invasive follicular thyroid neoplasm with papillary-like nuclear features (NIFTP) on the diagnosis of thyroid nodules[J]. *Gland Surg*, 2019, 8 (Suppl 2):S86–S97. doi:10.21037/gs.2018.12.01.
- [41] Pool C, Walter V, Bann D, et al. Molecular characterization of tumors meeting diagnostic criteria for the non-invasive follicular thyroid neoplasm with papillary-like nuclear features (NIFTP) [J]. *Virchows Arch*, 2019, 474(3): 341–351. doi:10.1007/s00428–018–02512–6.
- [42] Parente DN, Kluijfhout WP, Bongers PJ, et al. Clinical safety of renaming encapsulated follicular variant of papillary thyroid carcinoma: is NIFTP truly benign? [J]. *World J Surg*, 2018, 42(2): 321–326. doi:10.1007/s00268–017–4182–5.
- [43] Patel N, Bavikar R, Lad YP, et al. A comparison of the WHO 2004 and WHO 2017 thyroid tumor classifications[J]. *J Cancer Res Ther*, 2024, 20(1):311–314. doi:10.4103/jcrt.jcrt_1797_22.
- [44] Baloch ZW, Harrell RM, Brett EM, et al. American association of clinical endocrinologists and American college of endocrinology disease state commentary: managing thyroid tumors diagnosed as noninvasive follicular thyroid neoplasm with papillary-like nuclear features[J]. *Endocr Pract*, 2017, 23(9): 1150–1155. doi:10.4158/EP171940.DSCR.
- [45] Thompson LD. Ninety-four cases of encapsulated follicular variant of papillary thyroid carcinoma: a Name change to Noninvasive Follicular Thyroid Neoplasm with Papillary-like Nuclear Features would help prevent overtreatment[J]. *Mod Pathol*, 2016, 29(7): 698–707. doi:10.1038/modpathol.2016.65.
- [46] Xu B, Tallini G, Scognamiglio T, et al. Outcome of large noninvasive follicular thyroid neoplasm with papillary-like nuclear features[J]. *Thyroid*, 2017, 27(4): 512–517. doi:10.1089/thy.2016.0649.
- [47] Mao ML, Joyal T, Picado O, et al. Noninvasive follicular thyroid neoplasm with papillary-like nuclear features reclassification and its impact on thyroid malignancy rate and treatment[J]. *J Surg Res*, 2018, 230:47–52. doi:10.1016/j.jss.2018.04.013.
- [48] Kakudo K. How to handle borderline/precursor thyroid tumors in management of patients with thyroid nodules[J]. *Gland Surg*, 2018, 7(Suppl 1):S8–S18. doi:10.21037/gs.2017.08.02.
- [49] Wong KS, Barletta JA. Challenges in encapsulated follicular-patterned tumors: how much is enough? evaluation of nuclear atypia, architecture, and invasion[J]. *Surg Pathol Clin*, 2023, 16(1): 27–44. doi:10.1016/j.path.2022.09.005.
- [50] Alharbi J, Alraddadi T, Sebeih H, et al. Noninvasive follicular thyroid neoplasm with papillary-like nuclear features: what a surgeon should know[J]. *Cureus*, 2023, 15(1): e33649. doi:10.7759/cureus.33649.

(本文编辑 熊杨)

本文引用格式: 蔡伟, 赵菁, 李开富, 等. 乳头样核特征的非浸润性甲状腺滤泡性肿瘤的病理特征及外科治疗: 附33例报告[J]. *中国普通外科杂志*, 2024, 33(11): 1766–1774. doi: 10.7659/j.issn.1005–6947.2024.11.003

Cite this article as: Cai W, Zhao J, Li KF, et al. Pathologic features and surgical treatment of noninvasive follicular thyroid neoplasm with papillary-like nuclear features: a report of 33 cases[J]. *Chin J Gen Surg*, 2024, 33(11): 1766–1774. doi: 10.7659/j.issn.1005–6947.2024.11.003